

သိင်္ဂါပင်စေ့အောက်ဝင်



မုန့်ပင်

Blank area with horizontal lines, likely for a library or collection stamp.

မွေဆိပ်

အရှေ့တောင်


စုဆောင်းရေးသားသူ
ဆရာကြီးဦးတင်ဦး

ဘေယုဗွေ

အမြူတေစာစဉ် (၁)

နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဘက်ဝင်

မရုံးပင်



စာအုပ် စာတမ်း ကြိုတင်ပုံနှိပ်ခွင့်ပြု အမှတ် ၉၄၆

စာအုပ်စာတမ်း မျက်နှာဖုံး ပုံနှိပ်ခွင့်ပြု အမှတ် ၄၅

၁၉၈၁-ခု။ ဖေဖော်ဝါရီလ

စာအုပ်ရေ (၃၅၀၀) ပထမအကြိမ်

အဖုံးပုံနှိပ် အောင်ရဝိန်။

တအုပ် ၁၀/

ထုတ်ဝေသူ။

။ဦးတင်ဦး(၀၂၉၀၇)

အမြူတေစာပေတိုက်၊ အမှတ် ၉၃၆/၁-လမ်း။

ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း။

ပုံနှိပ်သူ။

။ဦးအောင်ကွန်း(၀၁၃၂၉)

အောင်ရဝိန်ပုံနှိပ်တိုက်၊

အမှတ် ၇၂ (က) ရေတာရှည် လမ်းဟောင်း၊

ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။

မာ တိ ကာ

စဉ်

စာမျက်နှာ

၁။ နိဂါဇ်

၂။ မရိုးပင်၏အကျဉ်းချုပ်စွမ်းအင်သတ္တိများ ၆

၃။ အင်္ဂါစုအလိုက်အသုံးပြုပုံ ၈

၄။ ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ၁၀

နှာစေးရောဂါ ၁၁

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါ ၁၂

ကိုယ်တခြမ်းသေနှင့်စောင်းရွဲ့သောရောဂါ ၁၅

ဝက်ရှူးရောဂါ ၁၉

မျက်စိရောဂါ ၂၁

သွားရောဂါ ၂၂

နားရောဂါ ၂၃

လည်ပင်းရောဂါ ၂၄

၅။ ရင်အုပ်အဆုတ်နှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ	၂၆
ချောင်းဆိုးပန်းနာဆေး	၃၂
နံဘေးခဲအာင့်ရောဂါ	၃၅
၆။ ဝမ်းခေါင်းဆိုင်ရာရောဂါများ	၃၆
အစာအိမ်ရောဂါ	၃၆
ကာလဝမ်းရောဂါ	၃၈
အသည်းနှင့်အဖျဉ်းရောဂါ	၃၈
အသားဝါရောဂါ	၄၀
မြင်းသရိုက်ရောဂါ	၄၀
၇။ အရေပြားနှင့်အဆစ်များ၌ဖြစ်သော ရောဂါများ	၄၂
အဆစ်ရောင်ကိုက်စားဆေး	၄၃
ယားနာ	၄၇
အဖျားရောဂါ	၅၁
၈။ မရိုးကို ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့၌ကုသပုံ	၅၅
ကာလသားရောဂါဆေး	၅၆
အကြောရောဂါ	၅၇
သုင်ယံနာဆေး	၅၈
၉။ ဝါဇီကရဏဆေးများ	၆၀
ကြေးနီပြာ	၆၁
သံမဏိပြာ	၆၅

	သံချေးပြာ	၆၆
	ဟင်းရိုင်း	၆၈
၁၀။	ရသာယန(အသက်ရှည်ဆေးများ)	၇၆
	ဆေးဒိန်းပြာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ	၇၈
	စိန်	၈၆
	ရတနာငယ်များ	၈၉
	ကြောင်ကျောက်	၉၀
	ကျောက်စိမ်း	၉၂
	လချေး	၉၄
	သမုဒ္ဒရာထွက်ဆေးပစ္စည်းများ	၉၈
	ခရသင်းပြာ (၁)	၁၀၀
	သန္တာ	၁၀၁
	ယောက်သွား	၁၀၃
၁၁။	ပြာအမျိုးမျိုး	၁၀၅
	ဒုတ္တာပြာဖြူ	၁၀၆
	ကုန္တန်ကျောက်	၁၀၇
	ဗဟန်းရွှေ	၁၀၉
	သမင်ဂျို(ချို)	၁၁၀
	ကြက်ဥခွံပြာ	၁၁၁

အမှားပြင်ချက်

မျက်နှာ	ကြောင်းရေ	အမှား	အမှန်
၁၂	၁၇	မရိုးဆေးတွင်	မရိုးစေးတွင်
၄၁	၇	မရိုးစေ့နှင့်	မရိုးစေးနှင့်
၄၈	၄	မရိုးဆေးသည်	မရိုးစေးသည်
၄၈	၁၃	ထိုမရိုးဆေး	ထိုမရိုးစေး
၅၆	၂	မရိုးဆေးကို	မရိုးပြစ်ကို
၅၉	၆	ရေပူပူတို့	ရေပူတို့
၆၂	၁၃	ခေါင်းရွဲ့သော	စောင်းရွဲ့သော
၆၃	၇	ကြေးနီပြာ	ကြေးနီပြား
၈၄	၁၁ (ခေါင်း)	ဆေးဒန်းဆတူ	ဆေးဒန်းဆတူ
၈၄	၁၇	ဆတူ	ဆတူ
၉၆	၁၉	မီးတိုသတိ	မီးကိုသတိ
၁၀၈	၇	မရိုးစေ့	မရိုးစေး
၁၀၈	၉	ပြုပြီးပါ	ပြုပြီးထားပါ
၁၀၉	၂၀	တစေ့ခန့်ပူ	တစေ့ခန့်ပူ
၁၁၀	၁၇ (ခေါင်း)	သမင်ချို	သမင်ဂျို (ချို)

နိဒါန်း

ရည်ရွယ်ချက်

- ၁။ မြန်မာပြည်တွင် သစ်ပင်မှကင်းသော အရပ်ဒေသဟူ၍ မရှိပေ။ အနည်းနှင့်အများရှိမည်သာ။ သို့ရာတွင် မြန်မာပြည်ရှိ လုပ်သားပြည်သူများနှင့် တောင်သူလယ်သမားများသည် ထိုသစ်ပင်များ၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုပုံများကို မသိရှိကြသောကြောင့် တန်ဖိုးမထားကြပဲ အလဟဿ ဖြုန်းတီးပစ်ကြခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။
- ၂။ ဆေးခန်းများနှင့်ဝေးကွာ၍ ဆေးဆရာများ ရှားပါးသော ဒေသများ၌ ရောဂါအားလျော်စွာ နီးစပ်ရာ သစ်ပင်များကို အလွယ်တကူ ခူးယူသုံးစွဲနိုင်ကြစေရန်။
- ၃။ တန်ဖိုးများသော နိုင်ငံခြားမှ မှာယူသုံးစွဲရသော ဆေးပစ္စည်းများ၏နေရာ၌ အစားထိုး သုံးစွဲ တတ်သော အသိပညာကို ရရှိလာစေရန်။
- ၄။ သစ်ပင်များ၏တန်ဖိုးကို သိရှိလာရသောကြောင့် ထိုသစ်ပင်များကို မိမိတို့၏လယ်ယာကွက်များ၊ ဥယျာဉ်များ၊ ခြံမြေဝင်းများ၌တနိုင်တနိုင် စိုက်ပျိုးမှုဝါသနာပါလာကြစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

မရိုးပင်ကို ပွဲထုတ်ရခြင်း

မြန်မာပြည်တွင် ရေးသားစရာသစ်ပင်များစွာရှိနေပါလျက် ဤမရိုးပင်ကို ရှေးဦးစွာ ရေးသားထုတ်ဝေရခြင်းမှာ မြန်မာ

ပြည်တွင် မရိုးပင်အလွန်ပေါများခြင်း၊ အရပ်ဒေသတိုင်းတွင် လည်း ရှိခြင်း၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ခြင်း၊ တန်ဖိုးမရှိဟု ထင်မြင်၍ ဖြုန်းတီးနေခြင်းတို့ကြောင့်လည်းကောင်း-

မရိုးပင်၏အမြစ်၊ အခေါက်၊ အသီး၊ အပွင့်၊ အရွက် စသည်တို့သည် ရောဂါများစွာကို ကုသရာ၌ အံ့ဩဖွယ် စွမ်းအင် သတ္တိများရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း-

ရှေးအခါက အိန္ဒိယပြည်ရှိ ရသေ့ကြီးများသည် ဓာတ်ဆေး အချို့တို့ကို ဤမရိုးပင်နှင့် ပြာချကြလျက် ကုသရန် မျှော်လင့်ချက်မရှိသော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းသည်ကို သိရှိစေလိုသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဤမရိုးပင်ကို ရှေးဦးစွာ ပွဲထုတ်ရပေသည်။

ရေးသားပုံ

အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းကြီးများတွင် ရေးသားထားသော မရိုးပင်၏ လက်တွေ့အသုံးပြုပုံများကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာပြည်ရှိ ရှေးသမားတော်ကြီးများ အသုံးပြုလာသောနည်းနာများကိုလည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခဲ့သော လက်တွေ့နည်းများကို စုဆောင်းရှာဖွေလျက် ဝါမရင့်သေးသော ဆေးဆရာများသာမက သာမန် အရပ်သူ အရပ်သားများပင် ဖော်စပ်အသုံးပြုနိုင်ကြရန် အလွယ်ကူဆုံးသောနည်းဖြင့် ရေးသား တင်ပြအပ်ပါသည်။

(မရိုးပင်)

မြန်မာ မရိုးပင်(အချို့ နေရာ၌ ငဖြူကြီးခေါ်သည်)
ရုက္ခဗေဒအမည် CALATROPIS PROCERA
အင်္ဂလိပ်အမည် GIGANTIC SWALLOW, WAST

သက္ကတအမည်များ

- (က) အက္က = နေကဲ့သို့ ထက်မြက်သောသတ္တိ ရှိသောအပင်၊
- (ခ) ခိရပဏ္ဏ = အရွက်မှ အစေးထွက်သော အပင်၊
- (ဂ) ဘူလဖလ = ဝါဂွမ်းထွက်သော အသီး ရှိသောအပင်၊
- (ဃ) အက္ကပဏ္ဏ ဝိကိရဏ - လေကြောင့် ဝါဂွမ်းများကို ဟိုဟိုဒီဒီလွင့်သောအပင်
- (င) အာဖောဋ္ဌ = အသီး ကွဲကျတတ်သော အပင်၊

ပင်ရင်းအမျိုးအနွယ်။ မရိုးအမျိုးအနွယ် (Asclepiadaceae)

ဂဏ်း = ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စသော မလများကို ဖြိုခွဲ
တတ်သော သတ္တိရှိသော ဘေဒနီယဂိုဏ်းဝင်
ဆေးပစ္စည်းမျိုး၊ အန်စေတတ်သော သတ္တိရှိ
သော ဝမနေဂပဂိုဏ်းဝင် ဆေးပစ္စည်းမျိုး။
ချွေး ကို ထွက် စေ တတ် သော သတ္တိရှိသော
သေဒေါပဂိုဏ်းဝင် ဆေးပစ္စည်းမျိုး၊
အောက်သို့သက်စေတတ်သော သတ္တိရှိသော
အဓောဘာဂဟရဂိုဏ်းဝင် ဆေးပစ္စည်းမျိုး။
အစေးထွက်တတ်သောသတ္တိရှိသော ခိနုသယ
ဂိုဏ်းဝင်ဆေးပစ္စည်းမျိုး။

အပင်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်။ ။ခြုံသဘောရှိသော အပင်ငယ်မျိုး၊
အများအားဖြင့် ၄ ပေခန့်မြင့်၏။ ပင်စည် မာသည်၊ ပင်စည်
ခေါက် မီးခိုးရောင်ရှိပြီး အချင်များရှိသည်။ အရွက် ၄ လက်မ
မှ ၆ လက်မအထိ ရှည်သည်။ ၁ လက်မမှ ၃ လက်မအထိ
ကျယ်၍ထူသည်။ နှလုံးပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ အပေါ်ဘက်သည်
ချောမွတ်လျက် အောက်ဖက်တွင် အမွေးများရှိသည်။ အရွက်
ပေါ်တွင် အစိမ်းရောင် မရိုးလိမ်ပြာခေါ်ပိုးတမျိုးကို အမြဲလိုလို
တွေ့ရတတ်သည်။ ၎င်းကိုလည်း ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ
သည်။

အပွင့်အပြင်ဖက်တွင် ဖြူသည်။ အတွင်းဖက်တွင် နီရောင်
သန်းလျက် ခရမ်းရောင်ကဲ့သို့ရှိသည်။ အပွင့်၏ အလယ်တွင်

လေးညှင်းပွင့်ကဲ့သို့ အပွင့်ကလေးများရှိသည်။ ၎င်းကို မရိုးလေးညှင်းဟု ခေါ်သည်။ ထိုမရိုးလေးညှင်းသည် ဆေးအလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည် မရိုးပင်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးထက် အဆိပ်ဓာတ်နည်းပါးသည်။

အပွင့်များကြွေကျသောအခါ အသီးသည် လှပစွာထွက်လာသည်။ ထိုအသီး၏အလေးချိန်မှာ အလွန်ပေါ့သည်။ အနည်းငယ်ဖိလိုက်ရုံမျှနှင့် ကွဲသွားသည်။ အိန္ဒိယပြည်ရှိ ကလေးငယ်များသည် မရိုးသီးကို မြေတွင်ချ လျက်-ခြေထောက်နှင့် နင်းသောအခါ အသံမြည်လာသည်ကိုနှစ်သက်သောကြောင့် မရိုးသီးချိန်တွင် အလွန်ပျော်ရွှင်စွာ ကစားကြသည်။ အမြစ်ကြီး၍ မြစ်မှာများ ရှိသည်။ ဝသန္တဥတုတွင်ပွင့်၍ ဂိမန္တဥတုတွင် သီးသည်။ အချို့အချို့သောအပင်များ၌ အရည်တမျိုးယိုစီးကျ၏။ ၎င်းကို အက္ကသက္ကရာ(မရိုးသကြား)ဟု ခေါ်ကြ၏။

အမျိုးအစားများ။ ။ အပွင့်ကို အစွဲပြု၍ (၁) အဖြူမျိုး (၂) အနီမျိုးဟူ၍ ၂ မျိုးရှိသည်။ အနီမျိုးကို အက္က၊ လက်တင်ဘာသာအားဖြင့် (*Calotropis gigantea*) ဟုခေါ်၏။ အဖြူမျိုးကို အလက္က၊ လက်တင်ဘာသာအားဖြင့် (*Calotropis Procera*) ဟု ခေါ်၏။

ထိုမှတစ်ပါး ခြံကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ မြင့်မားသောမရိုးပင်မျိုးလည်း ရှိသေးသည်။ ၎င်းကို ရာဇက္က (မရိုးဘုရင်)ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် အမြဲပွင့်နေသည်။ ၎င်းအပွင့်သည် အနံ့မရှိ၊ အဖြူသို့မဟုတ် ခရမ်းနုရောင်ရှိသည်။

ရာဇနိသဏ္ဌကျမ်း၌မူ....

- (၁) အက္က-အပွင့်နီ
- (၂) ရာဇက္က(အလက္က)-မရိုးဘုရင်
- (၃) သေတမဒါရ-အပွင့်ဖြူ

ဟူ၍ ၃ မျိုးရှိ၏ဟု ဆို၏။

ထိုမှတစ်ပါး အစေ့သည် တညင်းလုံးသဏ္ဌာန်ရှိလျက် အပွင့် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသော မရိုးပင်တမျိုး ရှိသေး၏။ ထိုအပင်မျိုးကို တွေ့ရှိရခဲ၏။ အဂ္ဂိရတ်သမားများ အသုံးပြုကြသည်။

ရရှိနိုင်သောဒေသများ။

မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား ဒေသအမျိုးမျိုး၌ ရရှိနိုင်၏။ သို့ရာ တွင် ခြောက်ဆွေ သောဒေသများ၌ ပိုမိုရရှိနိုင်၏။
ကိန်းဝပ်ဓာတ်များ။ ။အစေးတွင် ထရိုပင်(အသားဓာတ် ကို ကြေကျက်စေတတ်သောဓာတ်) အမည်ရှိ ဓာတ်တမျိုးနှင့် နို့ကိုခဲစေရန်နှင့်နှလုံး၌အလုပ်ကိုလုပ်ပေးစေတတ်သော ဥဆက ရင်(Uscherin)ကိုက်လိုထရိုပင် (Calotropin)ကိုက်လိုတိုဇင်း (Calotoxin)ဓာတ်များရှိ၏။ ရာဇက္က၌လည်း များသောအား ဖြင့် ဤဓာတ်များရှိကုန်၏။

ဓာတုဗေဒ ဝမ်းသပ်ချက်များ။ ။မရိုးပင်၏ မြစ်ခေါက်တွင် မဒါရအေလ်ဗန် (Mudar Alban)နှင့် မဒါရဖလူဗီလ် (Muda. Fluevi)ဟူသော ထူးကဲသောဓာတ် ၂ မျိုးရှိ၏။ ထို ၂ မျိုးအနက် မဒါရအေလ်ဗန်သည် အလွန်ထက်မြက်သည်။

ဤသာနှင့် အဲလ်ကိုဟော်လ်တွင် ပျော်ဝင်၏။ ရေအေးနှင့် မုန့်ညှင်းဆီတွင် မပျော်ပေ။ နွေရာသီတွင်ခဲသွား၏။ ဆောင်းရာသီတွင် လဟာပြင်၌ထားပါက ပျော်သွား၏။ ဤမျှသာမက သေး၊ ဤမဒါရအေလ်ဗန်၌ ခါး၍ ပူစပ်သောအရသာရှိလျက် အဝါရောင်ပွဲညက်ကဲ့သို့သော ဓာတ်တမျိုးပါဝင်၏။ ၎င်းသည် လည်း အလွန်ထက်မြက်သောသတ္တိရှိ၏ဟု ကာနယ်စောပရာက ဆို၏။

အရသာ	ခါးစပ်(အဖြူမျိုး)၊ ချိုခါး(အနီမျိုး)
ဂုဏ်	လဟု၊ ရုက္ခ၊ တိက္ခ
ဝိပါက	စပ်
ဝိရိယ	ပူ

မှတ်ချက်။ ။အနီမျိုးသည် ချိုခါးအရသာ ရှိသောကြောင့် သလိပ်နှင့် သည်းခြေကိုနှိုင်းသည်၊ ပူသော ဝိရိယရှိသောကြောင့် သလိပ်နှင့်လေကိုနှိုင်း၏။

အသုံးပြုသောအင်္ဂါ။ အမြစ်ခေါက်၊ အစေး၊ အပွင့်၊ အရွက်

အတိုင်းအတာ။ မြစ်ခေါက်၌ ၈ရမ်မှ ၁-၈ရမ်၊ အစေး ၃ မှ ၆ ၈ရမ်၊ အပွင့် ၁ မှ ၃-၈ရမ်

တားမြစ်ခြင်း။ အမြစ်ခေါက်ကို အတိုင်းအတာ ပိုလွန်၍ သောက်ခဲ့သော် အစာအိမ်ပူခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ အန်ခြင်း

ဖြစ်တတ်သည်။ ဤဆေးသောက်စဉ် နွားနို့၊ ထောပတ် စသော သိန်ဇွန်ရရှိသော အစာများကိုမစားရ။

(က) မရိုး၏ အကျဉ်းချုပ် ဝမ်းအင်သတ္တိများ

မရိုးပင်။ ။အာယုဗေဒ ကျမ်းများ၏ အလိုအားဖြင့် မရိုး ၂ မျိုးစလုံးသည် ဝမ်းကိုသက်စေ၏။ လေသလိပ်နိုင်၏။ နူနာရောဂါ၊ ယားယံခြင်း၊ အဆိပ်၊ အနာပေါက်၊ အဖျဉ်းရောဂါ၊ ဂူလုံးရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ ဝမ်းဗိုက်ရောဂါ၊ အသည်း၊ ပိုးရောဂါတို့ကိုနိုင်၏။

မရိုးစေး။ ။မရိုးစေးသည် ခါးသောအရသာရှိ၏။ အဆီအစေးရှိ၏။ ပူ၏။ အနူရောဂါ၊ ဂူလုံးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ စားသုံးခဲ့သော် အလွန်ဓာတ်သွား၏။ အန်၏။ လိပ်ခေါင်းကိုက်ခဲ့ခြင်း၊ သွားပိုးကြောင့် ကိုက်ခဲ့ခြင်းတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ အရေပြားပေါ်၌ လိမ်းကြံခဲ့သော် လောင်ကျွမ်းတတ်၏။

မရိုးပွင့်။ ။မရိုးပွင့်သည် ချိုသောအရသာ၊ ခါးသောအရသာရှိ၏။ ချုပ်၏။ နူနာရောဂါ၊ ပိုးရောဂါ၊ ကြွက်ဆိတ်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မရိုးမြစ်ခေါက်။ ။မရိုးမြစ်ခေါက်သည် ခါး၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ အစာကိုကြေကျက်စေတတ်၏။ သည်းခြေကို ယိုစီးစေတတ်၏။ ရသာရည်ကြိတ်များနှင့် အရေပြားတို့ကို

ထက်မြက်စေတတ်၏။ ဓာတ်တို့ကို ပြောင်းလဲစေတတ်၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေတတ်၏။ အနည်းငယ်မျှကိုသောက်ရုံနှင့် အစာသစ်အိမ်ကိုပူစေပြီး အန်စေတတ်၏။ ခွေးကို ထွက်စေတတ်၏။ ဝဖြိုးစေတတ်၏။ ပြဒါးကဲ့သို့ ရသာယာနဆေးဖြစ်၏။

မရိုးဆား(၁)။ သိန္ဓောဆားကို အမှုန့်ပြုပါ။ ၎င်းတွင် မရိုးရွက်ကို အတူရော၍ မြေအိုးတလုံးတွင်ထည့်ပါ။ အန္တာပိတ်ပါ။ မီးဖုတ်ပါ။ အလိုချမ်းသောအခါ မဲသောဆားကို ရပါလိမ့်မည်။ အမှုန့်ပြု၍ ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။

ဤဆားသည် အသည်းနှင့် အဖျဉ်းရောဂါတို့၌ကောင်း၏။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် အနည်းငယ်မျှစားခဲ့သော် ကျင်ကြီးသွက်လာ၏။ ဝမ်းချုပ်တတ်သောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဤမရိုးဆားကို ရေနင့် နေ့စဉ်မှိတ်ခြင်း မိမိနှင့်သင့်သော အစာအဟာရများကို စားသုံးခြင်းပြုပါက လေနှင့် သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းရောဂါ၊ နာတာရှည်တဝသို့မရောက်သေးသော အဖျဉ်းရောဂါ (အဖျဉ်းနှင့်ယှဉ်သည်ဖြစ်စေ၊ မယှဉ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဝမ်းချုပ်သည်ဖြစ်စေ) အသည်းတွင်အောင့်ခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကြောင့် အော်နေရခြင်း၊ အသည်းမာနေခြင်း ဖြစ်ပါစေ) ဝမ်းသက်ခြင်း၊ စသော လက္ခဏာမရှိပါက ပျောက်ကင်း၏။

မရိုးဆား (၂)။ မရိုး ဗုဇ္ဈငါးပံးကို အခြောက်လှန်းပါ။ ခြောက်လျှင် ပြာချပါ။ ထိုပြာကို မြေအိုးတလုံးတွင် ရေ(၈)ဆ

ထည့်ပြီး စိမ့်ပါ။ တနေ့ (၃)ကြိမ် တုတ်နှင့်မွှေပါ။ (၄) ရက်
မြောက်သောအခါ အပေါ်မှ ရေကိုခွဲယူပါ။ (ပိုက်နှင့်စုတ်ယူ
လျှင် ပိုကောင်းသည်။) ထိုရေကို မီးနှင့်ချက်လျှင် ဆားရပါလိမ့်
မည်။ ယင်းဆားကို အမှုန့်ပြုပြီး ပိတ်ပါးနှင့်ချပါ။ ဤဆားသည်
ထက်မြက်၏။ စားသုံးပါက ဂူလုံးရောဂါ၊ အဖျဉ်းရောဂါ
စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အစာကိုကြေစေတတ်၏။
ရသာရည်ဓာတ်ကို ဖြစ်ပွားစေတတ်၏။ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ
တတ်၏။ ပန်းနာရောဂါ၊ ရင်ကျပ်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ
၏။ ဤဆားတွင် သိန္ဓောဆား၊ ဇဝက်သာတို့ကို ဆတူရော၍
ရေနှေး သို့မဟုတ် စမုန့်စပါးပေါင်းတိုက်ရေနှင့် သောက်ပါက
အစာမကြေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။

ဤဆား၌ ငြုတ်ကောင်း၊ ပိတ်ချင်း ချင်းခြောက်ကို သင့်
တော်ရုံမျှထည့်၍ လျက်ခွဲသော် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော
ပန်းနာချောင်းဆိုးရောဂါတို့ပင် သက်သာရာရ၏။ မရိုးဆား၊
သိန္ဓောဆား၊ ဂျုံဆား၊ ဤ ၃ မျိုး ဆတူရောပြီး သင့်တော်ရုံမျှ
အတိုင်းအတာဖြင့် ရှားဖောင်းလက်ပတ်ရေ အနှုပါ နှင့်
သောက်ခွဲသော် အသည်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အင်္ဂါ၂၀အလိုက် အသုံးပြုကြပုံ

အစာခြေအင်္ဂါ၂၀။ ဝမ်းမီးညှို့ခြင်း၊ အစာမကြေ၊ အသဲ
ဖောက်ပြန်၊ ဝမ်းချုပ်၊ ဝမ်းဗိုက်ရောဂါတို့၌ သုံးရသည်။

သွေးဆောင်ကြောအင်္ဂါစု။ နှလုံးအားနည်း၊ ဆင်ခြေ
ထောက်၊ ကာလသားရောဂါ၊ သွေးအန်သွေးကျရောဂါနှင့်
သွေးဖောက်ပြန်သော အခြားရောဂါများ၌ အသုံးပြုရသည်။

အသက်ရှူအင်္ဂါစု။ ပန်းနာရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊
အသက်ရှူကြပ်၊ အသက်ရှူမဝရောဂါများ၌ အသုံးပြုရသည်။

အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါစု။ အရေပြားရောဂါ၊ နူနာ စသည်
တို့၌ အသုံးပြုရသည်။

ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ

ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများသည် မြောက်မြားစွာရှိသော်လည်း မရိုးပင်နှင့်ကုသ၍ ပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါများကိုသာ ရေးသားမည်ဖြစ်သည်။ ဤဆိုလတ်သော နှာရှူဆေးများသည် ခေါင်း၌ဖြစ်သော ရောဂါများကို အံ့ဩဖွယ်ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။

နှာစေးရောဂါ

နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းသည် အခံရအလွန်ခက်သည်။ နှာခေါင်းပိတ်ရာမှ ခေါင်းကိုက်လာခြင်း၊ အင်္ဂါကြီးငယ်များကိုက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်လာတတ်သည်။

နှာရှူဆေး (၁)

ပေဂျီဆန်းမွေးဆန်ကို အလိုရှိသရွေ့ ခွက်တခုတွင်ထည့်ပါ။ အပေဂျီမှ မရိုးစေးကို မြုပ်အောင်ထည့်ပေးပါ။ မြူမှုန် စသည်

တို့ကို အတွင်းသို့မဝင်ရအောင် အပေါ်မှ ကောင်းစွာဖုံး၍ လုံခြုံသောနေရာတွင်ထားပါ။ မရိုးစေးများခြောက်သွားသော အခါ မရိုးစေးကိုထပ်ထည့်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ ခြောက်သွားသောအခါ ညက်စွာအမှုန့်ပြု၍ ဖလံပုလင်းတခုတွင်ထည့်ထားပါ။ ၎င်းကို နှာရှူဆေးအဖြစ်ဖြင့် သုံးပါ။ နှာပိတ်ရောဂါ၌ ကောင်းလှ၏။

နှာရှူဆေး (၂)

နွားချေးခြောက်ကို ပြာချပါ။ ၎င်းပြာကို အလိမ္မော်သရွေ့ယူပါ။ ထိုနွားချေးခြောက်များတွင် မရိုးစေးကို ယခင်နည်းအတိုင်း ၃ ကြိမ်ထည့်၍ အခြောက်ခံပါ။ ထိုနောက် အမှုန့်ပြုထားပါ။

အညွှန်း။ ၎င်းဆေးကို နှာမှုတ်တံဖြင့် နှာခေါင်းတွင်းသို့ မှုတ်ထည့်ပါ။ ခေါင်းကိုက်ရောဂါ၊ နှာပိတ်ရောဂါ၊ နားထင်ကိုက်ရောဂါ၊ သတိလွတ်သော ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ စသည်တို့ချက်ခြင်းသက်သာသွား၏။

သတိပြုရန်။ ဤဆေးသည် အလွန်ထက်မြက်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမများနှင့် ကလေးငယ်များကို မရှူစေရ။ အကယ်၍ ခြေဆတ်ခြင်းမရပ်ခဲ့သော် နွားထောပတ်ကို နွေးအောင်ပြုလုပ်လျက် ရှူပေးလျှင် ရပ်သွား၏။

နာဂျူဆေး (၃)

ကောင်းစွာကျက်သော အုတ်နီခဲဟောင်းကို အလိုရှိသရွေ့ အမှုန့်ပြုပါ။ ထိုအမှုန့်တွင် ယခင်နည်းအတိုင်း မရိုးစေးဖြင့် ၃ ကြိမ်စိမ်လျက် အခြောက်ခံပါ။ ထိုအုတ်မှုန့် ၁၂ ပဲသား လေးညှင်းပွင့် ၇ ပွင့်ကို ညက်စွာအမှုန့်ပြု၍ ဖလ်ဗူးတခုတွင် လုံခြုံစွာ သိမ်းထားပါ။

အညွှန်း၊ ၎င်းဆေးမှုန့်အနည်းငယ်ကို ရှူပေးခဲ့သော် နှာမိတ်ခြင်း၊ နားထင်ကိုက်ခြင်း၊ မေးရိုးကိုက်ခြင်းစသည်တို့ ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါ

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါသည် အလွန် အခံရခက်သော ရောဂါဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာမကုသနိုင်ခဲ့သော် မျက်စိအားနည်းခြင်း၊ မျက်စိများရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပေါက်သည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆံပင်သည် ဖြူလာနိုင်သည်။ ၎င်းရောဂါအတွက် အောက်ပါဆေးများသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ပျောက်နှာဆေး(၁)။ ကုလားအုပ်ချေးကို မရိုးဆေးတွင်စိမ်၍ အခြောက်လှန်းပါ။ ထိုနောက် မီးနှင့်ပြာချပါ။ အမှုန့်ပြုပြီး ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။ ၎င်းကိုရှူပေးပါ။

အညွှန်း။ ။ ခေါင်းတခြမ်းသာကိုက်ခြင်း၊ တခေါင်းလုံးကိုက်ခြင်း၊ နားထင်ကိုက်ခြင်း၊ မေးရိုးကိုက်ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ပျောက်နှာဆေး (၂)

- | | | |
|-----|--------------|------|
| (၁) | ကောက်ကြီးဆန် | ၁-၈ |
| (၂) | ဒုတ္တာ | ၁-၈ |
| (၃) | ပရပ် | ၁-၈ |
| (၄) | ချင်းခြောက် | ၁၂-၆ |

ဤဆေးများကို အမှုန့်ပြုပါ။ မရိုးစေးနှင့်စိမ်ပါ။ အခြောက်ခံပါ။ ထိုဆေးတို့ကို မီးညှင်းညှင်းတွင်လှော်ပြီး ထပ်မံ အမှုန့်ပြုပါ။ ဤဆေးကို ဗာဒံဆီ သို့မဟုတ် ဆိတ်နို့ နှင့်ရောပြီး နှာခေါင်းတွင် ထည့်ပါ။

အညွှန်း။ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းတခုလုံးလုံးကိုက်ခြင်း၊ နာတာရှည်နှာစေးခြင်း စသော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ပျောက်ဆေး (၃)။ သလဲခေါက် ၂-ကျပ်သားကို အမှုန့်ပြု၍ မရိုးစေးတွင်နယ်၍ အလုံးလုပ်ပါ။ မီးညှင်းဖြင့်ဖုတ်ပါ။ အမှုန့်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုနောက် ဇော်ဂျီမုတ်ဆိတ် ၃-ပဲ၊ ပိတ်တကျည်းသီး ၁-ပဲ အားလုံးရော၍ အမှုန့်ပြုပါ။ ထိုအမှုန့်ကို ရှူပေးပါ။

အညွှန်း။ နှာစေးရောဂါ၊ ခြေဆတ်ရောဂါ၊ သတိမေ့ခြင်း။ ခေါင်းတခြမ်း ကိုက်ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ပျောက်ဆေး(၄)။ မရိုးမြစ်ခေါက်ကိုခွါ၍ နေပူတွင် အခြောက်လှန်းပါ။ ထို့နောက် ဖာလာစေ့ ၇-စေ့၊ ငြုတ်ကောင်း ၁-ပဲသားရော၍ အမှုန့်ပြုပါ။ ဇကာနှင့်ချပါ။ အလိုရှိသောအခါ အနည်းငယ်ရှူပေးပါ။

အညွှန်း။ ဦးခေါင်းအတွင်းရှိ မကောင်းသောအညစ်အကြေး များထွက်လျက် ခေါင်းကြည်လာမည်။ ထို့ပြင် ခေါင်းတခြမ်း ကိုက်ခြင်း၊ မေးကိုက်ခြင်း ပျောက် ကင်း၏။

မရိုးမြစ်ခေါက်ခွါယူနည်း။ ။မရိုးပင်သည် အသက်ကြီးလေ လေ ကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူ အစေးတွင် အခါးဓာတ်ပိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အစေးဓာတ်သည်လည်း ဧပြီလနှင့် မေလတို့တွင် ပိုမိုရရှိ ည်။ သဲမြေတွင်ပေါက်သော မရိုးပင်သည် ပိုကောင်းသည်။ ပထမ မရိုးမြစ်ကိုတူးပြီး သဲတို့ကို လက်နှင့်ဖယ်ပစ်ပါ။ ထို့နောက် ရေနွင့်ဆေးကြောပစ်လျက် အရိပ်တွင်လှန်းပါ။ ၂၄-နာရီ ကြာသောအခါ အပေါ်က ကပ်နေသောမြေနှင့် အပေါ်ခေါက်ကိုခွါပြီး အတွင်းခေါက်ကို အရိပ်တွင်လှန်းပါ။ အားလုံး ညီညီညာညာခြောက်သွေ့လျှင် အမှုန့်ပြု၍ အဖုံးရှိသောပုလင်းတွင် ထည့်ထားပါ။ မြစ်ခေါက် မှုန့်သည် ဆန်မှုန့်ရောင်ရှိလျှင် အကောင်းစားမရိုးမြစ်ခေါက်မှုန့် ဟု မှတ်ယူပါ။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ပျောက်ဆေး (၅)။ ။မရိုးရွက်ရင့်ရင့် (အရောင်ဝါရမည်)ကို နွားထောပတ်နှင့်သုတ်ပြီး မီးကင်ပါ။

ခြောက်၍ပူလာသောအခါ လက်နှင့်နယ်၍ အရေညစ်ယူပါ။
 ထိုရေကို ပုလင်းတွင်ထည့်လျက် ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။
 အညွန့်။ ။လူနာကို ကောင်းစွာအိပ်စေပြီး နှာခေါင်းတွင်းသို့
 အစက်ချပေးပါ။ ခြေဆတ်လာလိမ့်မည်။ နှာရေများ
 ကျလာမည်။ ချက်ချင်း ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ပျောက်
 ကင်းသွားလိမ့်မည်။ ဤဆေးသည် ခေါင်းတခြမ်း
 ကိုက်ရုံသာမက နားထင်ကိုက်ခြင်း၊ မေးရိုးကိုက်
 ခြင်း၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း စသည်တို့ကိုပါ ပျောက်
 ကင်းစေသည်

ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါနှင့် စောင်းရွဲ့သောရောဂါ

ကိုယ်တခြမ်းသေနှင့် စောင်းရွဲ့ ရောဂါတို့သည် အလွန်
 ကြောက်စရာကောင်းလှသည်။ အချို့ ညာဘက်တခြမ်း အချို့
 ဘယ်ဘက်တခြမ်း သေသွားတတ်သည်။ အချို့ မျက်နှာရွဲ့သွား
 တတ်သည်။ ဤရောဂါ ၂-မျိုးစလုံးသည် ခေါင်းပိုင်းနှင့်ပတ်
 သက်နေသည်။ အကြောင်းမူ အကြောအားလုံးသည် ခေါင်းနှင့်
 ဆက်သွယ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မရိုးပင်သည် အကြော
 တူသရွေ့ ကိုအံ့သြဖွယ် အကျိုးပြုသည်။


မရိုးဆီ(၁)။ ။နှမ်းဆီကို သံဒယ်အိုးတခုတွင်ထည့်၍ မီးပေါ်
 ဖိုက်ပါ။ ထိုနောက် မရိုးရွက်ကို ဆီနှင့်ကြော်ပါ။ အရွက်များ
 မီးကျွမ်းသွားသောအခါ ဆီကိုစစ်ယူပါ။ ၎င်းဆီကိုလိမ်းပါ။

အညွန့်။ ။တခြမ်းသေ ရောဂါ၊ စောင်းရွဲ့သော ရောဂါ
 စသည်တို့၌ အလွန်ကောင်းသည်။

မရိုးဆီ(၂)။ ။အဝတ်စ တကိုက်မျှကို မရိုးစေးတွင် စိပ်၍ အခြောက်ခံပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၂၁-ကြိမ်ပြုလုပ်လျက် ကပ် ကျေးနှင့် သေးသေးညှပ်ပါ။ ထိုနောက် ပါတာလယန္တရားဖြင့် ဆီကိုထုတ်ယူပါ။ ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ဤဆီဖြင့် နာနာပွတ်ပေးပါ။ ဤဆေးသည်လည်း ခေါင်းရွဲ့ သောရောဂါနှင့် ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါ တို့၌ အလွန်ကောင်းသည်။

ပါတာလယန္တရားဖြင့်အဆီထုတ်ယူပုံ



ပုံပြပါအတိုင်း ၂ တောင်ခန့် နက်သော တွင်းတခုကို တူးပါ။ တွင်းအောက်ခြေတွင် ဇလုံတခုခံပါ။ အပေါ်တွင် သံဒယ်တခုကိုတပ်ပါ။ ထိုဒယ်တွင် အပေါက် ဖောက်ပါ။ နောက်ထပ် အဝတွင်သံဇကာတပ်ထား၍ ဇော်သရွတ်မံထားသော ပုလင်းတခုကိုယူပါ။ (ဇော်သရွတ်ကို ခိုင်အောင်အထပ်ထပ် မံပါ) ထိုပုလင်းတွင် ဆေးပစ္စည်းများကို ထည့်ပါ။ ယင်းပုလင်းကိုမှောက်၍ သံဒယ်တွင်တပ်ပါ။ ပုလင်းနှင့် သံဒယ်အကြားကိုဖာထေးပါ။ ထိုနောက် သံဒယ်တွင် မီးသွေးများ ထည့်ပြီး မီးထည့်ပါ။ ဆီများသည် ဇလုံတွင် စုနေလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုယူပါ။

မရိုးဆီ(၃)။ ။မရိုးစေးကို ဖလံဗူးတခုတွင်ထည့်ပါ။ ထိုနောက် မရိုးဆေးနှင့်ဆတူ ကြက်သွေးကိုထည့်ပါ။ ထိုဆေးကို လိမ်းပေးပါ။

အညွန့်း။ ။ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါနှင့် စောင်း ရွဲ့ သော ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါကို ရှေးဆရာကြီးများကုသပုံ

ရှေးဆရာကြီးများသည် ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါနှင့် အဆစ်ရောင်ကိုက်ရောဂါကို အောက်ပါအတိုင်း ကုသကြ၏။

လေလုံသောနေရာ၌ လူတယောက်ထိုင်၍ မုန်း နေ နိုင်လောက်အောင် တွင်းတခုကိုတူးစေသည်။ ထိုတွင်းတွင် နွားချေးခြောက်ဘို့ကို ထည့်၍ တွင်းနံရံများအား မီးဖြင့် နီမြန်း

လာအောင် မီးရှို့ခိုင်းကြသည်။ နွားချေးခြောက်များသည် ပြာကျသွားသောအခါ မီးနှင့်တကွ ပြာစသည်တို့ကို ထုတ်ပစ် ခိုင်းကြသည်။ ထိုနောက် လတ်ဆတ်သော မရိုးရွက်များကို တွင်းအတွင်းသို့ အထည့်ခိုင်းကြ၏။ ထိုအခါ တွင်းအတွင်းမှ အခိုးများထွက်လာ၏။ အပူကိုခံနိုင်လောက်သောအခါ လူနာ ကို သိုးမွေးစောင်ခြုံလျက် အထိုင်ခိုင်းကြ၏။ အခိုးများသည် လူနာ၏မျက်နှာကိုမထိခိုက်အောင် ဖွင့်ထားစေကြသည်။

လူနာ၏တကိုယ်လုံးတွင် ချွေးများစိုရွှဲနေသောအခါ လူနာ ကို အဝတ်တစ်ခုနှင့် ခြုံလျက် အပြင်သို့ ထုတ်စေကြသည်။ နောက်တနေ့တွင် ကြက်ဆူစေ့ကို ဗာဒံသီးဆီနှင့် ကြော်ပြီး ပျားရည်နှင့်ရောကာ အလျက်ခိုင်းကြ၏။ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းသွား ခြင်းဖြစ်ကြမည်။ နောက်တနေ့တွင် နောက်ကဆီခဲသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်စေပြန်သည်။ သို့ရာတွင် ကြက်ဆူစေ့ကို ဗာဒံသီးဆီနှင့် ကြော်၍ မကျွေးကြ။ ဤနည်းအတိုင်း ၃ ကြိမ် ပြုကြသည်။ အလွန်ခက်ခဲသော ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါပင် ပျောက်ကင်း ကြသည်။

သတိပြုရန်။ ။ ရောဂါကုသရာ၌ ကိုယ်မှ အဖုကလေးများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ ဖျားလည်းဖျားတတ်သည်။ ကြောက်စရာ မလိုပါ။ လိုလိုပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ အဆစ် ရောင် ကိုက် ရောဂါ၌လည်းဤကုထုံးအတိုင်းကုသပါ။ ဤနည်းသည် ကျပ်ပုတီးနာစသော အကြိတ် အနုနာများ၌လည်း ကောင်း၏။

ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါပျောက်ဆေး

- (က) မရိုးရွက်အစိမ်း
- (ခ) ပိတိုင်းရွက်အစိမ်း
- (ဂ) ကြက်ဆူရွက်အစိမ်း
- (ဃ) တဇောင်းကြီးရွက်အစိမ်း
- (င) ကေရာဇ်ရွက်အစိမ်း
- (စ) ဒန့်ဒလွန်ရွက်အစိမ်း
- (ဆ) ကြိတ်မှန်ရွက်အစိမ်း
- (ဇ) ဆေးခြောက်ရွက်အစိမ်း

ဤဆေးအားလုံး ဆတူအရည်ညှစ်ပါ။ ဤသတ္တုရည်နှင့် ဆတူ နှမ်းနက်ဆီရောလျက် မီးနှင့်ချက်ပါ။ ဆီချည်းသက်သက် ကျန်သောအခါ အအေးခံ၍စစ်ပါ။ ဤဆီကို လူနာအား လိမ်းသောအခါ ပိတ်ချင်းသီးနှင့် ငြုတ်ကောင်းမှုန် အနည်းငယ် ရောပြီး လိမ်းပါ။

အညွှန်း၊ ဤဆေးသည် တခြမ်းသေရောဂါ၊ စောင်းရွဲ့ ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ကိုက် ရောဂါတို့၌ အလွန် ကောင်းသည်။

ဝက်ရူးရောဂါ

ဝက်ရူးရောဂါသည် အလွန် ကြောက်စရာကောင်းသော ရောဂါဖြစ်သည်။ ကြာမြင့်လာသောအခါ ဝက်ရူးတက်နေစဉ်

အတွင်း ကျင်ကြီးကျင်ငယ်၊ သက်တို့သည် ပါလာတတ်သည်။
 ကြာရှည်စွာလည်း မေ့မောနေတတ်သည်။ ဤ မေ့ မော
 နေခြင်းကို သတိရလာစေရန် အောက်ပါဆေးကိုအသုံးပြုပါ။
ဝက်ရူးတက်ပျောက်ဆေး။ ၊မရိုးမြစ်ခေါက်ကို ကြာမြင့်စွာ
 ရေစိမ်ထားပါ။ ဝက်ရူးတက်နေစဉ် လူနာ၏နှာခေါင်းအတွင်း
 သို့ ၂စက် ၃စက်မျှ ချပေးပါ။ ချက်ချင်း သတိရလာပါလိမ့်
 မည်။

ဝက်ရူးရောဂါကုထုံး။ ။နာတာရှည် ဝက်ရူးရောဂါ ရှိသူ၏
 လက်ဖဝါးကို မရိုးစေးကိုသုတ်ပေးပါ။ အပေါ်မှ ငြုတ်ကောင်း
 မှုန့်ကို ဖြူးပေးပါ။ မရိုးရွက်များကို ခြေဖဝါးအောက်တွင်
 ခံ၍ ခြေအိတ်ဝတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း နေ့စဉ် အရက် ၄၀
 အထိ ပြုလုပ်ပါ။ သို့ရာတွင် ခြေထောက်ကို မဆေးကြောရ
 ဝက်ရူးရောဂါပျောက်ကင်းသည်။

ဝက်ရူးပျောက်နှာဆေး။ ၊မရိုးပင်ကရသော ပိုး(လိပ်ပြာ)ကို
 ဖမ်း၍ ဖလံဗူးတခုတွင်ထည့်ပါ။ အလိုလိုခြောက်သွားလိမ့်မည်။
 ထိုအခါ ပိုးကောင်နှင့်ဆတူရော၍ ငြုတ်သီးကို အမှုန့်ပြုပါ။
 ၎င်းအမှုန့်ကို အနည်းငယ်စီအရှူခိုင်းပါ။ တဖြည်းဖြည်းဝက်ရူး
 ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

တနည်း။ ။မရိုးပွင့်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နှင့် ငြုတ်ကောင်းကို
 ဆတူရော၍ အမှုန့်ပြုပါ။ လဲစေ့ခန့်လုံးပါ။ တနေ့ ၂ ကြိမ်
 ၃ကြိမ်တိုက်ပါ။ ဝက်ရူးရောဂါ၊ ပန်းနာရောဂါ၊ သွေးဖောက်
 ပြန်သောရောဂါ၊ အကြောရောဂါတို့၌ ကောင်း၏။

မျက်စိရောဂါ

မရိုးပင်တွင် ထက်မြက်သော အစွမ်းသတ္တိရှိသောကြောင့် မျက်စိရောဂါ၌ မရိုးကို အသုံး နည်းပါးကြသည်။ သို့ရာတွင် အသုံးပြုတတ်ပါက မရိုးသည်မျက်စိရောဂါအချို့တို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။

မျက်ရည်ယိုပျောက်ဆေး။ ။ညအိပ်သောအခါ မရိုးစေးများကို မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ၏ခြေသဲလက်သဲတို့၌ လိမ်းပြီးအိပ်ပါ။မနက် အိပ်ရာကထသောအခါမျက်ရည်ယိုရောဂါပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်(မျက်စိနှင့်ပါးစပ်အတွင်းသို့မဝင်စေရန်အထူးသတိပြုပါ)။

တိမ်သလာဆေး။ ။နောက်ကပြဆိုခဲ့သည့် မရိုးပဉ္စငါးပါးမှ ချက်၍ ရသောဆားကို ညအိပ်ရာဝင်သောအခါ ရေစိမ်ပြီး ခတ်ပါ။ တိမ်သလာဖုံးခြင်းပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိယား၊ မျက်စိနီဆေး။ ။မရိုးမြစ်ခေါက်ကို သွေး၍ မျက်စိ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိမ်းပေးခဲ့သော် မျက်စိယားခြင်း၊ မျက်စိနီခြင်း၊ မျက်ခွံရောင်ခြင်း စသည်တို့ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိနာပျောက်ဆေး။ ။ဝါဂွမ်းကိုမီးဇာပြုလုပ်ပါ။ထိုမီးဇာကို မရိုးစေးတွင်စိမ်၍ အခြောက်လှန်းပါ။ ယင်း မီး ဇာ ကို မီးခွက်တွင်ထည့်ပြီး နှမ်းဆီနှင့်မီးထွန်းပါ။ မီးလောင်၍ ပြာကို ရလိမ့်မည်။ ယင်းပြာကိုအမှုန့်ပြုပြီး ပုလင်းတခုတွင် ထည့်ပြီး သိမ်းပါ။

အညွန့်။ ။ညအိပ်ယာဝင်သောအခါ မျက်စဉ်းတံဖြင့်ခတ်ပါ။ မျက်စိနာခြင်း၊ မျက်ခွံ ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

တိမ်ရောဂါပျောက်ဆေး၊ ၊ ဝါဂွမ်းဟောင်းကို မရိုးစေးတွင်
 ၃ ကြိမ်စိမ်၍ ၃ ကြိမ်နေလွန်းပါ။ ထိုနောက် နွားထောပတ်နှင့်
 စိမ်ပြီး ဖလ်ဗူးတခုတွင်မီးရှို့ပါ။ ပြာရပါလိမ့်မည်။ (ဖြူဆွတ်
 သွားအောင် ပြာမချရ)။

အညွန့်။ ၊ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် ထိုပြာကို မျက်စဉ်းတံဖြင့်
 မျက်စဉ်းခတ်ပါ။ ၃ ရက်ဆက်၍ခတ်ပါ။ တိမ်သလာ
 ပျောက်ကင်း၏။ (ထက်မြက်သည်သတိပြုပါ)။

မျက်စိအလင်းရောင်ကောင်းဆေး။ ။ မရိုးဖြူ မြစ် ခေါက် ကို
 ထောပတ်ခဲနှင့်ကြိတ်၍ မျက်စဉ်းခတ်ပေးပါ။ မျက်စိသည် ပိုမို
 မြင်လာမည်။

တိမ်ရောဂါပျောက်ဆေး

အုတ်ဟောင်းမှုန့် ၁၂ ပဲကို မရိုးစေးတွင်စိမ်၍ အခြောက်
 လွန်းပါ။ ထိုနောက် လေးညှင်းပွင့် ၆ ပွင့်နှင့် ရောပြီး အမှုန့်
 ပြုလုပ်ပါ။

အညွန့်။ ။ ၎င်းအမှုန့်အနည်းငယ်မျှကို ရှူပေးခဲ့သော် တိမ်
 ရောဂါ၌ ကောင်းသည်။

သွားရောဂါများ

သွားနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများသည် မြောက်မြားစွာ ရှိ
 သည်။ သို့ရာတွင် မရိုးနှင့်ကုသ၍ ပျောက် ကင်း နိုင် သော
 ရောဂါများကိုသာ ရေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

သွားကိုက်ရောဂါ။ သွားကိုက်ရောဂါသည် အလွန် အခံရ ခက်သော ရောဂါမျိုးဖြစ်သည်။ ရေအေး သို့မဟုတ် အေးသော အစာအာဟာရများကို စားပါက အလွန် ကိုက်ခဲ လာတတ် သည်။ ရေခဲမုန့်၊ ဖာလူဒါ စသော အာဟာရကောင်းများကို စားချင်လျက်နှင့် မစားရ ရှိနေရတတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော သွားကိုက်ရောဂါမျိုးကို အောက်ပါဆေးများဖြင့် ကုသ နိုင် သည်။

သွားကိုက်ပျောက်ဆေး။ ။ တမာဆားကို လုံတခုတွင်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် မရိုးစေးကို ဆားမြုပ်အောင်ထည့်ပါ။ ဇော်မံပါ၊ မီးသွေးမီးတွင်စိုက်ပါ။ အားလုံးကျွမ်းသောအခါ အမှုန့် ပြု ထားပါ။

အညွန့်။ ။ သွားကိုက်သောအခါ သွားကိုနယ်ခြင်း၊ သိပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ ချက်ချင်း ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့် မည်။

နားရောဂါ

နားသည် ဦးဇောကန်နှင့်နီးကပ်လျက်ရှိသောကြောင့် နား တွင် ရောဂါတစုံတရာဖြစ်လာပါက လျင်မြန်စွာ ကုသပစ်ရ မည်။ နား၌ဖြစ်သောရောဂါတို့သည် အမျိုးမျိုးရှိရာတွင် မရိုး ပင်နှင့် ကုသ၍ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါမျိုးတို့ကိုသာ ပြဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။

နားကိုက်နှင့်နားပိုးရောဂါ။ ။ပိုးကြောင့်မခံမရပ်နိုင်အောင်
နားကိုက်နေသူများကို ဤဆေးဖြင့်ကုသပါ။ အပေါက်အပြဲ
မပါသော ဝါနေသောမရိုးရွက်များကိုခူး၍ မြူမှုန်စသည်တို့မှ
ကင်းစင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် ထောပတ်၊ ရှိန်းခို
သုတ်လိမ်းလျက် မီးကင်ပါ။ ပူလာသောအခါ အရည်ညှစ်၍
နားတွင်းသို့ထည့်ပါ။ ချက်ချင်းနားကိုက်ပျောက်ပြီးလျှင် နား
တွင်းရှိ ပိုးများသေသွားပါလိမ့်မည်။

နားထိုင်းပျောက်ဆေး။ ။အပေါက်အပြဲမပါ၍ ဝါနေသော
မရိုးရွက်များကိုခူးပြီး မြူမှုန်စသည်တို့မှ ကင်းစင်အောင် ပြု
လုပ်ပါ။ မီးကင်လျက် အရည်ကို နားတွင်းသို့ ညှစ်ထည့်ပါ။
နားထိုင်းရောဂါ၌ အကျိုးပြုသည်။

လည်ပင်းရောဂါ

ကျပ်ပုတီးနာ။ ။ကျပ်ပုတီးနာသည် ကုသရန် ခက်ခဲသော
ရောဂါမျိုးဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းဆေးဆရာအများစုကဤရောဂါ
ကို ကုသ၍မရသောရောဂါမျိုးဟု ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့်
ဤရောဂါမျိုးကို ကုသမည်ဆိုလျှင် ဂရုတစိုက်အရေးထားလျက်
ကုသမှ သင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤရောဂါအတွက် မရိုး ပင် ဖြင့်
ဖော်စပ်ထားသော အောက်ပါဆေးသည် အလွန်ကောင်း
သည်။

ကျပ်ပုတီးနာဆေး။ ။စိန်နီ ၁၂ ပဲသားကို ၂၃ ရက် အထိ
မရိုးစေးနှင့်ထုံပါ (ဝါ) ကြိတ်ပါ။ အလုံးကလေးများလုပ်လျက်

အခြောက်လှန်းပါ။ ထိုအလုံးကလေးများကို ကျောက်ချဉ်မှုန့်
၁၂ ပဲ၏အလယ်တွင်ထားပါ။ လုံကို ဖော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး
မီးနှင့် ဖုတ်ပါ။ (မီးသွေး ၄ ပိဿာ ကုန်သည်အထိ) အကုန်
ကျွမ်းသောအခါ အားလုံးကိုအမှုန့်ပြုလုပ်ပါ။ ကောင်းစွာ
သိမ်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ ဆန်တစေ့မှ နှစ်စေ့ခန့်အထိ ကုက္ကို စေ့ ဆံ
အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) ထောပတ်ခဲနှင့် ရော၍
မှီဝဲပါ။ ကျပ်ပုတီးနာပျောက်ကင်း၏။

ရင်အုတ် အဆုတ်နှင့်ဆိုင်ရာ ရောဂါများ

အများအားဖြင့် အဆုတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်တတ်သော ချောင်းဆိုးနှင့်ပန်းနာရောဂါတို့၌ မရိုးမင်သည် အကောင်းဆုံး ဟု တိုင်းရင်းဆေးဆရာများနှင့် ခေတ်သစ်ဆေးဆရာများက ဆိုကြ၏။ ဤ၌ ရင်ဘတ်နှင့်အဆုတ်တို့၌ဖြစ်တတ်သော ရောဂါ များကို မရိုးမင်နှင့်ကုသသော ဆေးနည်းများအနက် အကောင်း ဆုံးလည်းဖြစ်၍ လက်ရွေးစဉ်ဆေးများကိုသာ ပြဆိုမည် ဖြစ်သည်။

အလွယ်ဆုံးချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး။ ၊ မရိုးရွက်များကို မြေ အိုး တလုံးလုံးတွင်ဖြန့်ခင်းပါ။ အပေါ်မှ ရိုးရိုးဆားကိုဖြန့်ခင်း ပါ။ ဤကဲ့သို့ မရိုးရွက်တထပ် ဆားတထပ်ဖြင့် အိုးပြည့်သည် အထိခင်းပါ။ အိုးအဝကိုပိတ်ပါ။ ထို့နောက် တွင်းတတွင်း

တွင် ထည့်လျက် ဖွဲ့မီးနှင့် ဂုရုတ်ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ
ဆားများကိုကြိတ်၍ လုံခြုံစွာထားပါ။

အညွှန်း။ ။ချောင်းဆိုးလျှင် တနေ့သုံးကြိမ်မျှလျက်ပါ။ အလွန်
ကောင်းသော ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး ဖြစ်၏။
(သလိပ်ချောင်းကောင်းသည်)။

ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးနက်မှုန့်၊ မရိုးမြစ်ခေါက်ကိုအလိုရှိ
အရွေ့ယူ၍ အိုးတခုတွင်ထည့်ပြီးနောက် ဇော်မံ၍ ဖွဲ့မီးနှင့်
ကြိတ်ကြေဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ အမှုန့်ပြု၍ ဖလံဗူးတခုခု
တွင် ထည့်ထားပါ။

အညွှန်း။ ။ဆေးတပဲသားကို ပျားရည်သင့်ရုံမျှရော၍ တနေ့
နှစ်ကြိမ်လျက်ပါ။ ချောင်းဆိုးရောဂါ၌ ကောင်း
လှသည်။

ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးလုံး

- (က) မရိုးပွင့်ဝဏ္ဏံ
- (ခ) ပိတ်ချင်းသီး (အငယ်မျိုး)
- (ဂ) ဆားပုတ်

ဤဆေးများဆတူရော၍ ငြုတ် ကောင်းစေ့ ခန့် အလုံး
ကလေးများလုံးပါ။ နေရိပ်တွင်လှန်းပါ။

အညွှန်း။ ။၂လုံးမှ ၄-လုံးအထိ နွားနို့နှင့်သောက်ပါ။ ကလေး
များအတွက်မူ တလုံးမှတခြမ်းတိုက်ပါ။

အံ့ဘွယ်ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး။ အလွန်ရင့်သော မရိုးမြစ်
ကို ရေနွှဲဆေးကြောပြီး မီးနှင့်ဖုတ်လျက် မီးသွေးကဲ့သို့ ပြု
လုပ်ပါ။ ၎င်းကိုအမှုန့်ပြု၍ပုလင်းတခုတွင်ထည့်ပါ။ မြေပုံတခုတွင်
မြှုပ်ထားပါ။ ထိုမြေပုံကို မနက်ည ရေနွှဲဆွတ်ပေးပါ။ (ရေ
လောင်းပေးပါ) ဤနည်းအတိုင်း ၆ လအထိပြုလုပ်ပါ။ ၆လ
စေ့လျှင် ထုတ်ယူ၍ ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ဆေးတပဲသားခန့်ကို ကွမ်းရွက်နှင့်ထုပ်ပြီးစားပါ။
မည်သည့် ချောင်းဆိုး ရောဂါမျိုးမဆို ပျောက်
ကင်း၏။ ချောင်း ခြောက် ဆိုး လျှင် မလိုင် နှင့်
သောက်ပါ။

တနည်း ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး။ ။မြေပုံခရမ်းပွင့် (ခရမ်း
ရောင်)ကိုခူး၍ နေရိပ်တွင်လှန်းပါ။ ၃-ကြိမ်မရိုးစေးတွင်စိမ်၍
အခြောက်လှန်းပါ။ အမှုန့်ပြုလုပ်လျက် ဖလ်ဗူးတွင် ထည့်
ထားပါ။

ဆေးညွှန်း။ ။ဆန်စေ့ ၂-စေ့ခန့်ကို ကွမ်းရွက်နှင့် ထုတ်ပြီး
ဝါးစားပါ။ ချောင်းဆိုးရောဂါ၌အလွန်ကောင်း
သည်။

တနည်း ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး။ ။စမုန်ဖြူ ၃-ကျပ် ၁၂-ပဲ
သားကို မြေအိုးတခုတွင်ထည့်ပြီး မရိုးစေးတပေါင်လောင်းထည့်
ပါ။ ဇော်သရွက်မံလျက် နေလှန်းပါ။ ထို့နောက် မီးသွေး ၁၀
သိသာနှင့်ဖုတ်ပါ။ အကုန်ကျွမ်းသောအခါ အမှုန့်ပြုပါ။

ဆေးညွှန်း။ ။ ၂-ပြားအထိ ပျားရည်နှင့်ရော၍ လျက်ပါ။
သလိပ်ချောင်းဆိုး ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာရောဂါသည် အလွန်ဒုက္ခပေးသော ရောဂါမျိုး ဖြစ်၏။ ပန်းနာရောဂါထသောအခါ အသက်ထွက်မတတ်ခံစား ရတတ်သည်။ လူနာသည် တရံတခါ ရပ်နေရတတ်၏။ တရံတခါ အသက် မထွက်ရအောင် ရှေ့သို့ကိုင်းလျက် နေရတတ်၏။ ထို့ကြောင့် အန္တိယပြည်တွင် ပန်းနာသည်ပန်း၍ သေရတတ် သည်ဟု ဆိုရိုးစကားများပြု၏။ ဤကဲ့သို့သော လက္ခဏာများ အထိ ဖြစ်တတ်သောပန်းနာမျိုးကိုပင် မရိုးပင်သည် ကယ်တင် နိုင်စွမ်းရှိသည်။

ကျွန်ုပ်သည် ပန်းနာရောဂါနှင့်ပတ်သက်သော ဆေးနည်း ကောင်းများကို မိမိတို့၏ ပရိယေသနအတွက် လျှို့ဝှက်စွာ စုဆောင်းထားသူများ၊ ဖော်စပ်ရောင်းချနေသူများထံသို့ ချဉ်း ကပ်ပြီး အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် တင်ပြပေအံ့။

ပန်းနာရောဂါကုသနည်း။ ။ ပန်းနာရောဂါရှိသူလူနာကိုတွေ့ ရှိလျှင် ပထမဆုံး အစုံပန်းနာမျိုးလား သို့မဟုတ် အခြောက် ပန်းနာမျိုး သို့မဟုတ် စိလိုက်ခြောက်လိုက်ဖြစ်နေသော ပန်းနာ မျိုးလားဟူ၍ ကြည့်ရှုရမည်။ အကယ်၍ ချောင်းဆိုးပြီး အလွန် အကဲ သလိပ်ထွက်ကျသော် အဆုတ်ကို ဦးစွာအန်ဆေးကျွေး၍ စင်ကြယ်စွာပြုလုပ်ပေးရမည်။ သို့မှသာ လူနာသည် ၅-လ သို့မဟုတ် ၆-လခန့် ငြိမ်သက်သွားမည်ဖြစ်၏။ အကယ်၍ လူနာ သည် ခွန်အားဗလနည်းနေလျှင် အန်ခြင်းကို သည်းမခံနိုင်ခဲ့ သော် သလိပ်ကိုကျစေသော ဝမ်းနှုတ်ဆေးမျိုးကိုပေး၍ ကုသရ

မည်။ ထိုနောက် အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းစေနိုင်သော ပန်းနာဆေးမျိုးကို ပေးရမည်။ အခြောက်ပန်းနာမျိုးကိုမူ စိုအောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်။ စိုလိုက်ခြောက်လိုက်ဖြစ်သော ပန်းနာမျိုးကို ညီမျှအောင် ပြုလုပ်ပေးရမည်။ ဤပန်းနာ ၃-မျိုးအနက်မှ မရိုးပင်နှင့် ကုသ၍ရသော ပန်းနာမျိုးကိုသာ ရေးသားမည်။

အန်ဆေးနည်း။ ။အန်စေရန် သင့်လျော်သော အချိန်မှာ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ခူးလများဖြစ်၏။ ဤလများမှတစ်ပါး အန်ဆေးကျွေးရန်မသင့်။ အန်သောအခါ တစ်တရာ ဒုက္ခမဖြစ်စေရ။ အန်ဆေးမကျွေးမီ ၂-ရက်၊ ၃-ရက် ကြိုတင်၍ အစာကို လျော့စားစေရမည်။ မရိုးမြစ်ခေါက်ကို နေရိပ်တွင်လှန်းပါ။ ခြောက်သောအခါ အမှုန့်ပြုလျက် ဖလ်ဗူးတွင် သိမ်းဆည်းထားပါ။ အလိုရှိသောအခါ အရွယ်နှင့် ရောဂါအလိုက် ၁-ပဲသားမှ ၂-ပဲသားအထိ ရေနွေးနှင့် သောက်ပါ။ အန်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အအန် နည်းပါးနေသေးလျှင် ရေနွေးထပ်သောက်ပါ။

သလိပ်ပန်းနာဆေးလုံး (၁)။ ။ဝါသော မရိုး ၇-ရွက်ကို ဆုံတွင်ထည့်ပြီးကြိတ်ပါ။ ၎င်းတွင် မှန်ကူသီး ၂-ပဲသားကို ထည့်လျက် ၂-ပြားသားခန့် အလုံးကလေးများလုံးပါ။ အရိပ်တွင် လှန်းပါ။

ဆေးညွှန်း။ ။မနက်-ည တလုံးစီ နွားနို့နှင့် သောက်ပါ။ အကယ်၍ ပူသောအချိန် ဖြစ်ပါက ညအချိန် အညာမြင်းခွါရွက် ၃-ပဲသားကို ရေနှင့်စိပ်ပြီး

အရေညှစ်ပါ။ ထိုရေနှင့် တလုံး သောက်ပါ။
နောက်နေ့တွင် ရေခွေးနှင့်သောက်ပါ။ သလိပ်
သည် အမြစ်ပါမကျန်ကျပါလိမ့်မည်။

ဖန်းနာပျောက်ဆေး(၂)။ ။အလိုအလျောက် ကြွေကျလျက်
ရင့်၍ဝါသော အရွက်များကိုကောက်ယူပါ။ ထုံးနှင့် ဆား ၆
ကျပ်သားကိုကြိတ်ခါ အရွက်များပေါ်တွင်တင်ပါ။ ဤနည်း
အတိုင်း အထပ်ထပ်လုပ်ပါ။ အိုးတခုတွင်ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ်
မံလျက် ပြာဖြစ်သည်အထိဖုတ်ပါ။ (၁-ရက်မှ ၂-ရက်ထိ
ဖုတ်လျှင် ပြာကျ၏။) ပြာကိုအမှုန့်ပြုပြီး ဖလ်ဗူးတခုတွင် ထည့်
ထားပါ။

အညွန့်။ ။ညအိပ်သောအခါ ၂-ပြားသားမှ ၃-ပြားသား
အထိ ကွမ်းရွက်နှင့်ထုပ်ပြီး ဝါးစားပါ။ (ဤဆေး
စားစဉ်အတွင်း ဆီနှင့်အချဉ်ကိုရှောင်ရမည်)။

မှတ်ချက်။ ။ဤနည်းကို အလွန်ကျော်ကြားသော ဒေါက်တာ
လည်းဖြစ်၊ တိုင်းရင်း ဆေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သော
ဂူလာမ်ဂျီနီအမည်ရှိသူ ရေးသားထားသော အိမ်
ဆရာဝန် အမည်ရှိစာအုပ်မှရသည်။

ဖန်းနာပျောက်ဆေး(၃)။ ။လတ်ဆတ်သောအုန်းသီးတလုံးကို
အပေါ်မှ အခွံကိုတဖြေးဖြေးခွါပါ။ အောက်အခွံကိုလည်း
ထုတ်ယူပါ။ အပေါက်တခုကိုဖောက်ပါ။ အုန်းရေများကိုထုတ်

ယူပါ။ အုန်းသီးအတွင်းသို့ မရိုးစေးများထည့်ပါ။ ဤနည်း
အတိုင်း တပတ်ထားပါ။ ခမ်းသွားသော မရိုးစေးကို ထပ်
ဖြည့်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၃-ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး ခြောက်သွားသည်
အထိထားပါ။ ထို့နောက် ဇော်သရွတ်မံ၍ မီးသွေး ၁၅ ပိဿာ
နှင့် ဖုတ်ပါ။ အကုန်ကျမ်းသောအခါ ညက်စွာကြိတ်လျက်
ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ အစိုပန်းနာရှိသောလူနာအား ၂-ပြားသားခန့်
ကို ကွမ်းရွက်စိမ်းရေနှင့်၊ အခြောက်ပန်းနာရှိသော
လူနာအား ထောပတ်ခဲနှင့်တိုက်ပါ။

ချောင်းဆိုးပန်းနာဆေး

စမုန် ၅ ပါး ၄-ကျပ်သားကို မြေအိုးတခုတွင်ထည့်ပြီး မရိုး
စေးကို စမုန်ငါးပါးကိုစိုစွတ်အောင်ထည့်ပါ။ အရိပ်တွင်လှန်း
ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၃-ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် မြေအိုး
တလုံးတွင်ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ်မံလျက် မီးသွေး ၆ ပိဿာဖြင့်
ဖုတ်ပါ။ ပြာသည်ဖြူနေမှကောင်း၏။ မဖြူလျှင်ထပ်မံဖုတ်ပါ။
အမှုန်ပြုကာ ကောင်းစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ ၁ ပြားသားမှ ၂ ပြားသားအထိ သကြားနှင့်ရော၍
မနက်ညသောက်ပါ။ ပန်းနာချောင်းဆိုး ရောဂါ
ကောင်း။

ပန်းနာပျောက်ဆေးလုံး (၄)

- (က) မရိုးလေးညှင်း (လေးညှင်းပွင့်ကဲ့သို့မရိုးပွင့်မှ
ရသောပစ္စည်း)
- (ခ) ပိတ်ချင်းငယ်
- (ဂ) သိန္ဓောဆား

ဤဆေးများအသီးသီး ၃ကျပ်သားစီ၊ အမှုန့်ညက်စွာကြိတ်
ပါ။ တောဆီးသီးခန့် (ယိုးဒယားဆီးသီးခန့်မဟုတ်) လုံးပါ။

အညွှန်း။ ။နံနက်တွင် ရေနှေးနှင့်တလုံးသောက်ပါ။ ပန်းနာ
ရောဂါ ပျောက်ကင်း။

ပန်းနာပျောက်ဆေး(၅)။ ။မရိုးရွက်အပွေး (မရိုးရွက်စိမ်း
များပေါ်တွင် ဝါဂွမ်းကဲ့သို့ အဖြူပွေးကလေးများ) ကို
ဓားဖြင့် ခြစ်ယူလျက် ဂျုံစေ့ခန့်အလုံးကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။

အညွှန်း။ ။မနက်/ညတလုံးစီစား၍ ကွမ်းစားပါ။ ပန်းနာ
ရောဂါသည် ၂ရက် ၃ရက်အတွင်း ပျောက်ကင်း
သွားပါလိမ့်မည်။ (နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရောဂါ
လည်း ကောင်း၏။)

နာတာရှည်ပန်းနာချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး။ ။မရိုးလေးညှင်း
ကို တနေ့ ၈ပွင့် တပတ်စားပါ။ ဒုတိယပတ်က စ၍ ၂ ပွင့်
စားပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၁၀ ပွင့်အထိစားပါ။ ဥတုကျော်
ပန်းနာချောင်းဆိုးရောဂါများ ကောင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ ဤနည်းသည် အိန္ဒိယပြည်ရှိ ရသေ့ကြီးများ၏ လက်သုံးဆေးဖြစ်၏။

နာတာရှည်ပန်းနာချောင်းဆိုးဆေး

မရိုးလေးညှင်း (၀.၅) ကို အလိမ္မော်သရွေ့ ယူပါ။ ထိုမရိုး ၀.၅ တစ်ခုတွင်းသို့ ပြုတ်ကောင်းစေ့ တစ်ခုစီသွင်းပါ။ ထိုနောက် မြေအိုးတစ်ခုတွင် အပေါ်အောက်သင့်လျော်ရုံဆားထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ်မံ၍ ပေါင်မုန့်ဖုတ်သောဖိုအတွင်းသို့ ပေါင်မုန့်နှင့်အတူ ထည့်ဖုတ်ပါ။ မနက်ကျလျှင် ထုတ်ယူ၍ အမှုန့်ပြုပါ။

အညွှန်း။ ။ ၁။ ခဲသားခန့်ကို ကွမ်းရွက်စိမ်းရေနှင့်တိုက်ပါ။ ဤဆေးသည် ဖြစ်စဖြစ်သော ပန်းနာ ချောင်းဆိုး ရောဂါမျိုးများသာမက၊ ဥတုကျော်၊ နှစ်ကျော် ပန်းနာချောင်းဆိုး ရောဂါများပါမကျန် ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး

မရိုးပင် ပဉ္စငါးပါးကို နေရိပ်တွင်လှန်းပါ။ ထို့နောက် ပြာချပါ။ ထိုပြာကို ရေရှစ်ဆနှင့်ဖျော်ထားပါ။ ၃ ရက်၊ ၄ ရက် ကြာသောအခါ အပေါ်ရေကြည်ကို ဆားချက်ပါ။

အညွှန်း။ ။ ၂။ ပြားသားမှ ၁ ခဲသားအထိ နံနက်/ည ရေခွေးနှင့် သောက်ပါ။ သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော ပန်းနာ ချောင်းဆိုးပျောက်၏။

နံဘေးအောင့်ရောဂါ

နံဘေးအောင့်တတ်သော ရောဂါသည် အလွန် အခံရ ခက်သည်။ တရံတခါ အော်ဟစ် နေရတတ်၏။ တောလက် ကျေးရွာများတွင် ထိုရောဂါများဖြစ်လျှင် အခက်နှင့် ကြုံနေ ရတတ်၏။ ထိုသူတို့အတွက် အောက်ပါဆေးများကို အသုံး ပြုပါ။

နံဘေးအောင့်လိမ်းဆေး (၁)

မရိုးရွက်ကိုအရည်ညှစ်ပါ။ ဤအရည်တွင် ဂျုံမှုန့်ကိုထည့်၍ ကော်ကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။ နံဘေးအောင့်သူကို အောင့် သောဘက်မှ လိမ်းပါ။ ဝါဂွမ်းကိုပူအောင်ပြုလျက် အပေါ်မှ ကပ်ပေးပါ။ လျှင်မြန်စွာ အအောင့်ပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။

နံဘေးအောင့်လိမ်းဆေး (၂)

နှမ်းနက်စေ့ အလိုရှိသရွေ့ ယူလျက်အမှုန့်ပြုပါ။ ထို့နောက် မရိုးစေးကိုထည့်ပါ။ လိမ်း၍ရအောင်ကြိတ်ပါ။ အောင့်လျှင် လိမ်းပါ။ ချက်ချင်း သက်သာသွားပါလိမ့်မည်။ (အောင့်၍ အော်နေရသူများပင် ပျောက်ကင်း၏။)

နံဘေးအောင့်ပျောက်ဆေး (၃)

မရိုးရွက်များကို မုန့်ညှင်းဆီသုတ်လျက် လက်ဝါးနှင့် ပူ အောင် ပွတ်ပေးပါ။ အောင့်သောနေရာကို စည်း ပေး ပါ။ ချက်ချင်းသက်သာသွားပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းခေါင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ

အစာအိမ်ရောဂါ

အစာအိမ်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏အင်္ဂါများအနက် ပဓာနအင်္ဂါ မဟုတ်သော်လည်း ပဓာနအင်္ဂါရပ်များသည် အစာအိမ်ကိုအမှီ ပြု၍ နေရသည်။ ဥပမာ ချမ်းသာကြွယ်ဝကြသောသူများနှင့် တုရင်များသည် မီးဖိုချောင်နှင့်မကင်းနိုင်သကဲ့သို့ ထိုအတူပင် ခန္ဓာကိုယ်ရှိအင်္ဂါကြီးငယ်ဟူသရွေ့သည် အစာအိမ်နှင့်မကင်း နိုင်ကြချေ။ အကယ်၍ အစာအိမ်သည် ကောင်းမွန်နေခဲ့သော် အလုံးစုံသော အင်္ဂါကြီးငယ်များသည် မိမိ လုပ် ရပ် များကို ကောင်းစွာလုပ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်၏။ အကယ်၍အစာအိမ်၌ ဒေါသ တစုံတရာဖြစ်လာခဲ့သော် အင်္ဂါရပ်များ၏ အလုပ်သည် မမှန် ကန်သောကြောင့် ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ အစာအိမ် ရောင်ခြင်း၊ အံခြင်း၊ လေချဉ်တက်ခြင်း၊ အစာမစားချင်ခြင်း စသော ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပေသည်။ ဤမျှသာ မကသေး၊ အဆီဒေါသကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါမြောက်မြား စွာ ဖြစ်လာတတ်ကုန်၏။

၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသောရောဂါသည် အစာအိမ်ကြောင့်သာ လျှင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အစာအိမ် စင်ကြယ်ရန်သည် အလွန် အရေးကြီး၏။ အစာအိမ်ကိုစင်ကြယ်စွာထားရမည်။ အစာအိမ် ဟူသည် စာတိုက်ဗူးကဲ့သို့ အမြဲဖြည့်လျက်နေကြရ၏။ ထိုအစာ အိမ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ရောဂါများသည် မြောက်မြားစွာ ရှိသည့်အနက် ဤတွင် မရိုးပင်နှင့် ကုသရသော အစာအိမ် ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများကိုသာပြမည်။

အစာအိမ်ရောဂါပျောက်ဆေးလုံး

၁။ မရိုးလေးညှင်း

၂။ ဆားပုတ်

၃။ ငြုတ်ကောင်း

ဤ ၃မျိုး ဆတူညက်စွာအမှုန့်ပြု၊ ကုလားပဲလုံးခန့်လုံးပါ။

ဆေးညှန်း။ ။ အရွယ်အလိုက် ၁လုံးမှ ၅လုံးအထိ သောက် ပါ။ အစာမကြေရောဂါ၊ မစားချင်မသောက် ချင် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ ဤဆေးလုံးကို နောက်ကပြခဲ့သော စမုန်စပါး နှင့် ဖော်စပ်သောဆေးနှင့်စပ်တိုက်ပါကအလွန် ကောင်း၏။

ဝမ်းဗိုက်အောင့်ပျောက်ဆေး

မရိုးပဉ္စငါးပါးဆားသည် အစာအိမ်တွင် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့၏ အမြိုက်သဘွယ်ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့်

ဝမ်းဗိုက်ထိုးအောင့်သောရောဂါနှင့် အစာမကြေရောဂါတို့၌ အလွန်ကောင်း၏။ ဝမ်းဗိုက်အောင့်သောအခါ ၂ ပြားသားမှ ၁ ပဲသားကို လျှာပေါ်တွင်တင်လျက် ရေနွေးနှင့်ငုံပြီးမှမျိုချပါ။ ချက်ချင်း ဗိုက်အောင့်ခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကာလဝမ်းရောဂါ

၁။ မရိုးမြစ်ခေါက်	၂ ဆ
၂။ ငြုတ်ကောင်း	၃ ဆ
၃။ ဆားပုတ်	၃ ဆ

ဤအလုံးစုံတို့ကို ညက်စွာအမှုန့်ပြုလျက် ဂျင်းစိမ်းရေနှင့် ၂ နာရီမှ ၃ နာရီခန့်ကြိတ်ပါ။ ကုလားပဲလုံးခန့်လုံးပါ။ လူနာသည် မျှော်လင့်ချက်မရှိသောအခါ တနာရီလျှင် တကြိမ်ကျ မရိုးစေးအနည်းငယ်စီတိုက်ပါ။

အသည်းနှင့်အဖျဉ်းရောဂါ

အသဲရောင်ရောဂါသည် အလွန်ခက်ခဲသောရောဂါဖြစ်၏။ အဖျားသည် အချိန်တိုင်းလိုလို အနည်းငယ်ရှိ တတ်၏။ လဲလျောင်းနေလျှင် နာကျင်ကိုက်ခဲတတ်၏။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း လုံးဝမရှိချေ။ အသက်ရှူ၍လည်းမကောင်းချေ။ အသဲနေရာကိုဖိကြည့်လျှင်နာကျင်တတ်၏။ အထူးခြားဆုံးမှာ လူနာ

သည် ညာဘက်ကိုစောင်း၍မအိပ်နိုင်ရုံတတ်ခြင်း၊ မျက်နှာသည် ညစ်နွမ်းလျက် သွေးမရှိသကဲ့သို့ တွေ့ရှိရတတ်၏။

အသည်းရောင်ပျောက်ဆေး

ဝါသောမရိုးရွက်နှင့်နွင်း ဤ ၂ မျိုးကိုဆတူရောပြီးအမှုန့် ပြုလုပ်ပါ။ ၂ပြားသားခန့် အလုံးကလေးများပြုလုပ်ပါ။

အညွှန်း၊ ။ဤဆေးလုံးကလေးများကို အောက်ပါပြုတ်ရည် နှင့် ပထမနေ့တွင် ၅လုံး၊ ဒုတိယနေ့တွင် ၆လုံး၊ နေ့စဉ်တလုံးစီတိုး၍ ၁၂ လုံးအထိ သောက်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း တနေ့တလုံးစီ လျှော့၍ ၅ လုံး ကျန်သည်အထိသောက်ပါ။အသည်းရောင်ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။

ပြုတ်ဆေး

- (၁) စမုန့်စပါး
- (၂) ကုလားမျက်စိ
- (၃) တဇောင်းလက်ပတ်

ဤဆေးများ ၁၂ပဲသားစီကို ရေတပေါင်နှင့် သုံးပုံတပုံ ကြွင်းပြုတ်ပါ။

မှာထားချက်။

။နောက်ကဆိုသည့်ဆေးသည် အသဲရောင် ရောဂါကိုသာမဟုတ်၊ ရေဖျဉ်းရောဂါကို လည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။

အသားဝါရောဂါ

အသားဝါရောဂါလက္ခဏာ။ ။အသားဝါ ရောဂါသည် အလွန်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါမျိုးဖြစ်၏။ မြန်မာပြည်အနှံ့ အပြားတွင် မကြာခဏဖြစ်တတ်၏။ အသားဝါ ရောဂါမှာ မျက်စိလည်းဝါတတ်၏။ အဝတ်အစားများကို ထိလျှင် စွဲနေ လောက်အောင် ဆီးများဝါတတ်၏။ ဆာ လောင် ခြင်းမရှိ တတ်။ မျက်နှာနှင့် ခြေသည်းလက်သည်းများလည်း ဝါနေ တတ်၏။ ရောဂါရင့်လာသောအခါ လူနာသည် မြင် မြင် နေ သရွေ့ ဝါနေသည်ဟု ထင်ရတတ်၏။

အသားဝါပျောက်ဆေး။ ။မရိုးမြစ်ခေါက် ၂ပဲသား၊ ငြုတ် ကောင်း ၁၁စေ့ကို ရေသင့်ရုံနှင့် နူးအောင်စိမ်လျက် စစ်ယူ ပါ။ နေ့အခါ၌ ၂ကြိမ်သောက်ပါ။ ပူသော အစားအစာ များကို ရှောင်ပါ။

မြင်းသရိုက်ရောဂါ

မြင်းသရိုက်ရောဂါသည် လူတရားတွင် ၅၀ခန့်၌ တွေ့ရှိရ တတ်၏။ မြင်းသရိုက်ရောဂါကိုအကြောင် ပြုလျက် နောက်ထပ် ဆင့်ပွားရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတတ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည် တွင် မြင်းသရိုက်ရောဂါတမျိုးတည်းကိုသာ ကုသနေသူတို့သည် မြောက်မြားစွာရှိလေသည်။ ထိုမြင်းသရိုက်ရောဂါ ကုသုံးတို့ သည် အမျိုးမျိုးရှိရာ ဤတွင် မရိုးပင်နှင့်ကုသရသော ကုသုံး ကိုသာ ပြဆိုမည်ဖြစ်သည်။

အသွယ်ဆုံးမြင်းသရိုက်ဆေး။ ။မရိုးပင်အနီးတွင် ကျင် ကြီး
စွန့်ပါ။ အနီးရှိမရိုးရွက် ၃ခုမျှကို ခူးလျက် စင်ကြယ်မှုကိုပြုပါ။
သို့မဟုတ် ကျင်ကြီးစွန့်သောအခါ မရိုးရွက် ၃ခုကို ယူသွား၍
စင်ကြယ်မှုကိုပြုလျှင် ရပါသည်။ ရက်ကြာသောအခါ မြင်း
သရိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားသည်။

မြင်းသရိုက်ရောဂါဆေးလုံး။ ။နန္ဒင်းကို အလိုရှိသရွေ့ ယူ၍
အမှုန့်ပြုပါ။ မရိုးစေ့နှင့်စိမ်ပါ။ အရိပ်တွင် လှန်း၍ ခြောက်
သောအခါ ထပ်ပြီးစိမ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၇ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။
ထို့နောက် မရိုးစေ့နှင့်ပင်တေလျက် အတောင့်ကလေးများ
ပြုလုပ်ပါ။

အညွန့်။ ။နံနက်/ည ၂ ကြိမ် သန့်စင်သောရေနှင့် သွေး၍
လိမ်းပါ။ ဤနည်းအတိုင်း အမြဲမပြတ် လိမ်းပေး
ပါက မြင်းသရိုက်သည် ခြောက်သွားပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံး ကြွေကျ သွားပါလိမ့်မည်။ နာကျင်
ကိုက်ခဲခြင်းမရှိပါ။ (ဤနည်းသည် အိန္ဒိယပြည်
ရသေ့ကြီးများကုသသော နည်းဖြစ်သည်။)

အရေပြားနှင့်အဆစ်များ၌ဖြစ်သော ရောဂါများ

အဆစ်များမှာဖြစ်သော ရောဂါများသည် (၁)အဆစ်ကြီးများ၌ နာကျင်ကိုက်ခဲသောရောဂါ၊ (၂) အဆစ်ငယ်များ၌ နာကျင်ကိုက်ခဲသောရောဂါဟူ၍ ၂မျိုးရှိသည်။ ဤ ရောဂါများသည် နာတာရှည် ဖြစ်လာသောအခါ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲ၏။

ရောဂါဖြစ်စတွင် အဆစ်အဆက်များ၌ ကိုက်ခဲခြင်း၊ ရောင်ခြင်းဖြစ်တတ်၏။ သို့ရာတွင် ရောဂါရင့်လာသောအခါ ထုံလာခြင်း၊ သွားလာမှု၊ ထိုင်ထမှု၊ တအက်မှုတဘက်သို့ လှည့်လည်မှုပင် ခက်ခဲလာ၏။ ဤရောဂါမျိုးအတွက် မရိုးပစ်သည်အလွန်ကောင်းသည်။

အဆစ်ရောင်ကိုက်ကြပ်ထုပ်ဆေး။ ။မရိုးရွက်များကို ထောင်း၍ အလုံးကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါ။ ထိုအထုပ်ကို ထောပတ်သုတ်လျက် ပူအောင်ပြုလုပ်ပြီး ကြပ်ထုပ်ထိုးပါ။ ထို့နောက် မရိုးရွက်ကို ထောပတ်သုတ်လျက် ပူအောင်ပြုလုပ်ကာ အပေါ်မှစည်းထားပါ။ သာမန် အဆစ်ရောင်ကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်ရောင်ကိုက်ဆီဆေး။ ။မရိုးရွက်များ မြေအိုး တခုတွင် ထည့်ပြီး ပေါင်မုန့်ဖုတ်သော ပူသောဖိုတွင်ထည့်ထားပါ။ မရိုးရွက်များသည် ပျော့ပျောင်းလာလျှင် ထုတ်ယူပြီး အရည် ညှစ်ယူပါ။ ထိုအရည်၏ထက်ဝက်မုန့်ညှင်းဆီကိုထည့်ပါ။ ကလိုင် လှော်ထားသော မြေအိုးတလုံးတွင်ထည့်ပါ။ မီးညှင်းညှင်းနှင့် ချက်ပါ။ ရေများခမ်း၍ ဆီသက်သက် ကျန်သောအခါချပါ။

အညွန့်။ ။ညအခါ လေမတိုက်သောနေရာတွင် ၁နာရီကြာမျှ ပွတ်လိမ်းပါ။ ဆေးလိမ်းပြီးနောက် ၃နာရီအထိ ရေမသောက်ရ၊ ထုံခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်ရောင်ကိုက်စားဆေး။ ။အိုးတလုံးအောက်တွင်မရိုးရွက် တရာမျှကို ထပ်၍ခင်းပါ။ ထိုအပေါ်တွင် ဂျင်းပင်၏အလက် ၄ကျပ်သားကို ဖြတ်တောက်၍ ထည့်ပါ။ ဂျင်း လက် များ ၏ အပေါ်တွင် မရိုးရွက်တရာမျှကို ညီညာစွာဖြန့်ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ ရေ ၆၂ ကျပ်သားထည့်ပါ။ အိုးအဝကို ကျောက် သို့မဟုတ် လေးလံသော အရာဝတ္ထုတခုနှင့် အခိုးများထွက်လျှင် လုံ

အောင် ဖုံးပိတ်ထားပါ။ အိုးကိုမီးပေါ်တင်ပါ။ ရေခမ်းလျှင် အသံရပ်သွားလိမ့်မည်။ ထိုအခါ မီးကိုရပ်ထားပါ။ တညလုံး ထိုနေရာတွင်ပင်ထားပါ။ မနက်စောစောဖွင့်ပါ။ မျက်နှာတွင် ထိုအိုးအတွင်းမှ အခိုးများမထိမိစေရန် သတိပြုပါ။ ထိုနောက် ဂျင်းလက်များကိုထုတ်ယူပြီး နွားထောပတ် ၃၁ ကျပ်သားနှင့် ကြော်ပါ။ ထို့နောက် ပျားရည်တွင် ဂျင်းလက်များကိုထားပါ (ပျားရည်ကို ဂျင်းလက်များ မြုပ်လောက်အောင် ထည့်ပါ) ထောပတ်ကို ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။

အညွန့်။ ။ဂျင်းလက်ကို ၁ပဲသားမှ ၃ပဲသားအထိကျွေးပါ။ ထို့ပြင် ထောပတ်ကိုလည်း ပေါင်မုန့်ကို သုတ်၍ ကျွေးပါ။ ထောပတ်ကို အဆစ်များ၌ ပွတ် လိမ်း လျက် နေပူတွင် တနာရီ၊ နှစ်နာရီမျှ အသိုင်ခိုင်းပါ။ ဆေးကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်း ရေအေး လေအေးကို အရှောင်ခိုင်းပါ။ ၃ရက်၊ ၄ရက်အတွင်း သက်သာ သွားပါလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် လူနာကို ပျားရည် နှင့် စိမ်ထားသော ဂျင်းခြောက်ကိုကျွေး၍ ယခင် အတိုင်း ထောပတ်နှင့်တကိုယ်လုံးလိမ်း၍ နေပူတွင် ထိုင်နေခဲ့သော် ချွေးများထွက်လျက် အဆစ်အဆက် များသည် ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ချွေးများ ထွက်လျှင် အဝတ်တစ်ခုနှင့် သုတ်ပေးပါ။ သို့မှသာ အညစ်အကြေးများသည် ချွေးနှင့်အတူပါသွားပါ လိမ့်မည်။

အလွယ်ဆုံးအဆစ်ရောင်ကိုက်ဆေး

- | | | | |
|-----|---------------|---|---------|
| (က) | မရိုးပွင့် | ၃ | ပိဿာ |
| (ခ) | စမုန်ဖြူ | ၃ | ပိဿာ |
| (ဂ) | ဒန့်ဒလွန်မြစ် | ၁ | ပိဿာ ၅၀ |

ဤဆေးများကို အိုးကြီးကြီးတစ်ခုတွင် ထည့်ပါ။ ဆေးများ အပေါ်တွင် ရေတမိုက်ခန့်တက်အောင် ရေကိုထည့်ပါ။ ဤ အတိုင်း ၉ ရက်ထားပါ။ ထို့နောက် နာ လိ ယန္တရား ဖြင့် ပေါင်းတိုက်၍ အဆီကိုထုတ်ယူပါ။

နာလိယန္တရားဖြင့် ပေါင်းတိုက်ပုံ

အိုးတလုံးတွင် ဆေးပစ္စည်းများကို ထည့်ပါ။ ထို အိုး ၏ အပေါ်တွင် အိုးတလုံးတင်ပါ။ ထိုအိုး ၂ လုံးတို့၏ ကြားကို ဇော်ထေးပါ။ အပေါ်အိုး၏ဖင်ဘက်မှ ပြွန်တစ်ခုကို တပ်ပါ။ ထိုပြွန်တံကို ရေထည့်ထားသော ဇလုံစသည်တို့တွင် မြှုပ်ပါ။ ထိုပြွန်တံ၏ထိပ်တွင် ပုလင်းတစ်ခု တပ်ထားပါ။ ထိုပြွန်တံမှ ပေါင်းရေများကျလာပါလိမ့်မည်။ ထိုပေါင်းရေ၏အပေါ်တွင် ဆီများပေါ်နေလိမ့်မည်။ ထိုဆီကို ခပ်ယူပါ။

အညွှန်း။ ။ ဆီ ၂ ပြားသားခန့်ကို ကွမ်းရွက်တွင်သုတ်၍ကျွေးပါ။ ဤဆေးသည် အဆစ် ရောင်ကိုက် ရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ရေဖျဉ်းရောဂါတို့၌ ကောင်းလှသည်။

အနာရောင်ကင်းခြင်း။ ။ အနာများမှည့်၍ ပြည်များ များ မတည်မီအတွင်းတွင် လတ်ဆတ်သောမရိုးစေး၊ နွားထောပတ် တို့ကို ဆတူယူလျက် ကောင်းစွာရောနှောပါ။ နေ့ အ ခါ ၌ အနာပေါ်တွင် ၂ကြိမ်၊ ၃ကြိမ်သုတ်လိမ်းပါ။ အနာသည် ပိန်သွားပါလိမ့်မည်။

ဖယောင်းချက်ညို။ ။ မြေအိုးတခုခုတွင် ဟင်းရိုင်းနီ ၃ကျပ် ၁၂ ပဲသားကို ထည့်ပြီး အပေါ်မှ ဟင်းရိုင်းကို ကောင်းစွာ စိုစွတ်အောင် မရိုးစေးကိုထည့်ပါ။ ခြောက်သောအခါ သံဒယ် အိုး တလုံးတွင် နှမ်းဆီ ၃၂ ကျပ်သားကိုထည့်လျက် မီးနှင့်ချက် ပါ။ ဆီကျက်ခဲ့သော် အောက်သို့ချလျက် အေး၍ ပြစ်ခဲ့လာ သည်အထိ ဒုတ်တခုခုနှင့်မွေ့နေပါ။ ဖလ်ဗူး တခုခုနှင့် ထည့် ထားပါ။

အညှန့်။ ။ အဝတ်တခုခုနှင့်ထုတ်၍ အနာကိုလိမ်းပါ။ အနာ သည် လျင်မြန်စွာ ပေါက်သွားမည်။ နာတာရှည် အနာဆွေး၊ အနာဟောင်းများ အထိ ပျောက် ကင်း၏။

မှာထားချက်။ ။ ဤဖယောင်းချက်၏ အထူးခြားဆုံးသတ္တိမှာ သုတ်လိမ်းထားသော အဝတ်တွင် ရေ သည် မ စို စွတ် နိုင်၊ ဖယောင်းချက်လိမ်း၍ တကြိမ်ကပ်ထားလျှင် အ နာ ပျောက် သည်အထိခံ၏။

ခြေထောက်နာပျောက်ဆေး။ ။မရိုးရွက် ၆ ရွက်၊ ၇ ရွက်ကို
ခြေထောက်ပေါ်တွင်တင်၍စည်းပါ။ အုတ်ကိုဖုတ်ပြီး အပေါ်မှ
ခြေထောက်ကိုတင်ပါ။ အုတ်ကိုရေလောင်းပေးပါ။

(ဤနည်းသည် ခြေထောက်တွင် ထွက်လာတတ်
သော အဖုကလေးများ ပျောက်ကင်း၏။)

ပွေးဆေး(၁)

(၁) မရိုးစေး၊ (၂) ပျားရည် ၂ မျိုးကိုဆတူရော၍ ပွေးကို
လိမ်းပါ။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပွေးဆေး(၂)

ပဲကတိုး (ပဲနံ့သာလဲရ၏) ၇ ရက်အထိ မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်
ပါ။ ပွေးကိုခြစ်ပြီးလျှင်လိမ်းပါ။ ၂ ရက် ၃ ရက်အတွင်း ပျောက်
ကင်း၏။

ပွေးဆေး(၃)

မရိုးပွင့်၊ ဆီးဖြူကန့် ၂ မျိုးဆတူ ဒိန်ချဉ်နှင့် ညက်စွာကြိတ်
ပြီး မနက်တကြိမ်၊ ညနေတကြိမ်လိမ်းပါ။ ရက် အနည်း ငယ်
အတွင်း ပျောက်ကင်း၏။

ယားနာ

ယားနာသည် (၁)အစို၊ (၂) အခြောက်ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိ
သည်။ ကုတ်ခွဲသော အဝါရောင်အရည်များထွက်သည်ကို အစို
ဟု ခေါ်သည်။ အရည်မထွက်သည်ကို အခြောက်ဟုခေါ်သည်။

ယားနာပျောက်ဆီ

မုန့်ညှင်းဆီ ၆ကျပ် ၁၂ပဲသားကို မီးနှင့်ချက်ပါ။ အရောင် အလွန်နီလာသောအခါ မရိုးစေး ၁၂ပဲသားကို တဖြည်းဖြည်း ထည့်ပါ။ မရိုးဆေးသည် လောင်ကျွမ်းပြီး မဲသွားသောအခါ ချပါ။

အညွှန်း။ ။ နေ့အခါ နှစ်ကြိမ်လိမ်းပါ။ ဂုရက်မြောက်သော အခါ ယားနာ ပျောက်ကင်း၏။ ဆေး လိမ်း ပြီး ဂုနာရီနောက်တွင် ရေချိုးနိုင်၏။ သို့ရာတွင် ဆေး မလိမ်းမီ ရေမချိုးရ။

ယားနာပျောက်ဖယောင်းချက်

မြေအိုးတခုတွင် မရိုးစေးကိုထုတ်၍ အရိပ်တွင် အခြောက် ခံပါ။ ခြောက်သောအခါ အိုးကိုခွဲလျက် စုခဲနေသောအစေး များကို ထုတ်ယူပါ။ ထိုမရိုးဆေးအခဲ ၁၂ပဲ၊ ထောပတ်ခဲ ၆ကျပ် ၁၂ပဲရော၍ ဖယောင်းချက်ပြုလုပ်ပါ။ ဖလံဗူးတခုတွင် မဖုံးပဲထည့်ထားပါ။

အညွှန်း။ ။ ၎င်းကို ပွတ်လိမ်းပါ။ ဆေးလိမ်းသောအခါ ကိုယ် ကို ရေမထိစေရ။ လေတိုက်မခံရ။ ဤနည်းသည် အဆိုးဆုံးသော ယားနာများပင် ပျောက်ကင်း၏။

ယားနာပျောက်ဆေး (၁) မုန့်ညှင်းဆီတပေါင်ကို ခွက်တခု တွင် ထည့်ပြီး မီးပေါ်တင်ပါ။ ဖျစ်ဖျစ် မြည်လာသောအခါ မရိုးရွက်ကိုဆီတွင်ထည့်ပါ။ တရွက် မီး ကျွမ်းသော အခါ

နောက်တရွက်ထည့်ပါ။ ဒုတိယအရွက် မီးကျွမ်းသော အခါ
တတိယအရွက်ကိုထည့်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၂၁ ရွက်ကုန်သည်
အထိထည့်ပါ။ အောက်သို့ချပါ။ ထိုတွင် ပဲနံ့သာမှုန့်အနည်း
ငယ်စီထည့်၍ လိမ်းပါ။ ယားနာပျောက်၏။

ယားနာပျောက်ဆေး(၂)

ဝါဂွမ်း အပိုင်း အစကို မရိုးစေး တွင် စိမ် ပါ။ နေ လှန်း
အခြောက်ခံပါ။ မီးရှို့ပါ။ မီးတောက်လောင်လျှင်လောင်ချင်း
ပူလင်းတခုနှင့်အုပ်ပါ။ သို့မှသာ ပြာကိုမရပဲ မီးသွေးကိုသာ
ရမည်ဖြစ်၏။ ထို့နောက် မုန့်ညင်းဆီနှင့် ရောလျက် လိမ်းပါ။
ခုရက်အတွင်း သက်သာသွားမည်ဖြစ်၏။

ယားနာပျောက်ဆေး(၃)

ဆီးဖြူကန့် ၆ကျပ် ၁၂ပဲသားကို မရိုးစေးနှင့် ၂၄ နာရီ
အထိကြိတ်လျက် နေရိပ်တွင် အခြောက်လှန်းပါ။ ထို့နောက်
ရေ ၂ပိဿာတွင်ဖျော်ပြီး မီးနှင့်ချက်ပါ။ ဤကဲ့သို့ချက်ခဲ့သော်
ဆီသည် ရေတွင်ကူးနေလိမ့်မည်။ ထိုဆီကိုသံယူပါ။ လိမ်းပါ။

အဆိပ်ရှိသောသတ္တဝါများကိုကုခြင်း

တောလက်ကျေးရွာရှိ တောင်သူ လယ် သမား များ သည်
ပျား၊ ခြင်၊ ယင်နှင့် မှက် စသည်တို့၏ ကိုက်ခဲမှုနှင့် မလွဲ မသွေ
မရှောင်သာ ရင်ဆိုင်နေရကြ၏။ ထို ပျား၊ ခြင်၊ ယင် စသည်တို့
အကိုက်ခံရခြင်းကို ပြီးပြီးပျောက်ပျောက် အရေးမကြီးဟု ထင်

နေကြသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့အကိုက်ခံရမှုမှ ထပ်ဆင့်လျက် ကြီးကျယ်သောရောဂါများသည် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် အဆိပ်ပြေရန်အတွက် မရိုးပင်သည် အခြားသော မြို့မှာနေထိုင်သူထက် တောင်သူလယ်သမားအဖို့ အရေးကြီးပေသည်။

အဆိပ်ပြေဆေး(၁)

ပျားခြင်၊ မှက် စသည်တို့ အကိုက်ခံရသော် အနီးရှိ မရိုးစေးကို ချက်ခြင်းယူလျက် ကိုက်သောနေရာကို လိမ်းပါ။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းပျောက်ကင်းလျက် ယောင်ရမ်းခြင်းလည်း ပျောက်ကင်းသွား၏။

အဆိပ်ပြေဆေး(၂)

ရိုင်းခိုကိုမရိုးစေးနှင့်စိမ်လျက် ၇-ကြိမ် နေလှန်းပါ။ အလုံးကလေးများ လုံးထားပါ။ ကင်းမီးကောက် စသည့် အဆိပ်ရှိသော သတ္တဝါများ ကိုက် ခဲ့သော် ရေနှင့် သွေး လျက် လိမ်းပေးပါ။ အထူးအားဖြင့် ကင်းမီးကောက်ဆိပ်၌ ကောင်း၏။

အဆိပ်ပြေဆေး(၃)

မုန်ညင်းဆီကို မြေအိုးတခုတွင်ထည့်ပါ။ မီးပေါ် တင်ပါ။ ဆီပူလာခဲ့သော် မရိုးရွက် သတ္တုရေကို ဆီတွင်ထည့်ပါ။ အခိုးများထွက်လာလိမ့်မည်။ ထိုအခိုးဖြင့် ကိုက် ခဲ့သော နေရာကို မှိုင်းခံပါ။ အဆိပ်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။

မြေဆိပ်ဖြေဆေး (၁)

မြေကိုက်သောအခါ မြန်နိုင်သရွေ့ မြန်စွာ မရိုးစေးကို မြေကိုက်သော နေရာသို့ ထည့်ပါ။ မရိုးစေးကို အတွင်းက စုတ်ယူလိမ့်မည်။ စုတ်ယူခြင်း ရပ်သွား ခဲ့သော် ရပ်ထားပါ။ (အဆိပ်ရှိက စုတ်ယူတတ်၏။ အဆိပ်မရှိလျှင်ရပ်သွားလိမ့်မည်။

မြေဆိပ်ဖြေဆေး(၂)

မြေကိုက်ခံရသူကို မရိုးရွက်များကိုကျွေးပါ။ အဆိပ်မပြေ မချင်း မရိုးရွက်၏ အခါး အရ သာ ကို လူနာသည်မသိချေ။ မရိုးရွက်၏ အခါးအရသာကိုသိလျှင် ရပ်ထားပါ။

ဗျာထားချက်။ ။မြေကိုက် ခံရသူကို မရိုးရွက်ကို ကျွေးနေ သည်ကို အသိမပေးရ။ အကယ်၍ အန်ခဲ့ သော် စိုးရိမ်စရာမရှိ။အဆိပ်သည် အန်ဖတ် နှင့်အတူ ပါသွားလိမ့်မည်။

ခွေးရူးဆိပ်ဖြေဆေး

ခွေးရူးကိုက်ခဲ့သော် ကိုက် သော နေ ရာ တွင် မရိုးစေးကို နေ့စဉ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ သို့ရာတွင် ပတ်တီးမစည်းရ။ဤနည်း အတိုင်း အရက် ၄၀ အထိပြုလုပ်ရမည်။

အဖျားရောဂါ

အဖျားရောဂါသည် အမျိုးမျိုး ရှိ သည့် အနက် မရိုးသည် ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျားများ တို့၌ အလွန်ကောင်းသည်။

ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျားပျောက်ဆေး(၁)

မရိုးမြစ်ခေါက်ကို အရိပ်တွင်လှန်းပါ။ ခြောက်သောအခါ
ရင်း၏ထက်ဝက် ငြုပ်ကောင်းနှင့် ရောလျက် အမှုန့်ပြုလုပ်ပါ။
နွားနို့နှင့် ရောလျက် ကုလား ဝဲ လုံး ခန့် အလုံး ကလေး များ
ပြုလုပ်ပါ။

အညွှန်း။ ။ အဖျားမတက်မီ နာရီဝက် (သို့မဟုတ်) ၁ နာရီက
ကြိုတင်လျက် ၁ လုံးမှ ၂ လုံးအထိတိုက်ပါ။ အများ
ဆုံး ၃ ရက်လောက် သောက် လျှင် အဖျား
ပျောက်၏။

ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျားတားဆေး(၁)

မပွင့်သေးသော မရိုးဖူးကို ထန်းလျက်နှင့် လုံး၍ တနာရီ
ကြိုတင်၍တိုက်ပါ။ ၃ ရက်မျှတိုက်ခဲ့သော် အဖျားတက်တော့
မည်မဟုတ်ပါ။

ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျား တားဆေး(၂)

မရိုးမြစ်ပြာတွင် သကြား ၆ ဆရောလျက်ထားပါ။ လူနာကို
အဖျားမတက်မီ ၂ နာရီစော၍ ရေခွေးနှင့် တိုက်ပါ။ အဖျား
တက်တော့မည်မဟုတ်ပါ။

ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျားကျဆေး။

မရိုးမြစ်ခေါက်ကိုအရိပ်တွင်လှန်း၍ ညက်စွာ အမှုန့်ပြုပါ။
အရောင်လိုလျှင် မြေနီမှုန့်နှင့် ရောထားပါ။ ၁ ပဲ သား ခန့်ကို

တခုနှင့်ရောလျက် ရေနွေးနှင့် သောက်ပါ။ ချွေးများထွက်၍ အဖျားကျသွားပါလိမ့်မည်။ (မရိုးမြစ်ခေါက်သည် ချွေးအလွန် ထွက်သည်။)

တရက်ခြား အဖျား

ရက်ခြား၍ နောက်တရက်မှ တက်တတ်သော အဖျားကို တရက်ခြားအဖျားဟုခေါ်သည်။ ၎င်းအဖျားမျိုးကို ဤဆိုလတံ သောဆေးများဖြင့်ကကွယ်ပါ။

တရက်ခြားအဖျားဆေး(၁)

မရိုးပွင့်ကို အလိုရှိသရွေ့ ယူပါ။ ထို့နောက် မရိုးပွင့်နှင့်ဆတူ လေးညှင်းပွင့်ထည့်ပါ။ ထန်းလျက်နှင့် ရော၍ ပြုတ်ကောင်း စေ့ခန့်လုံးပါ။ အဖျားရှိသူကို အဖျား မတက်မီ ၂ နာရီနှင့် အဖျားတက်ပြီးနောက် ၂ ခုစီ တိုက်ပါ။ (ပထမ တကြိမ်နှင့်ပင် အဖျား ရပ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဒုတိယ တကြိမ် သောက်လျှင် အဖျားပြတ်သွားပါလိမ့်မည်။)

တရက်ခြား အဖျားဆေး(၂)

မရိုးရွက် နှု ၂ ခုကို ထန်းလျက်နှင့်ရော၍ အလုံး ပြုလုပ်ပြီး တရက်ခြား အဖျားရှိသူကိုတိုက်ပါ။ ပထမတနေ့၌ပင် အဖျား တန့်သွားပါလိမ့်မည်။

ကွီနိုင်အချို့

ကမ္ဘာတွင် ငှက်ဖျားဖြတ်ရာ၌ ကွီနိုင်ကို အကောင်းဆုံးဟု ယူဆနေကြသည်။ အိန္ဒိယပြည်ကမူ ငှက်ဖျားဖြတ်ရာတွင် မရိုးစေးကို ကွီနိုင်ထက်ပင်ကောင်းသည်ဟု ဆိုကြ၏။ မရိုးစေးနှင့် ဖော်စပ်သော ငှက်ဖျားဖြတ်ဆေးကို မိထိကွီနိုင် (ကွီနိုင်အချို့) ဟု အမည်ပေးထားကြ၏။

အဖျားဖြတ်ကွီနိုင်အချို့

၁။ မရိုးစေး ၁ ပဲ

၂။ သကြား ၁၀ ပဲ

၂ မျိုးကိုရော၍ ခြောက်သည်အထိကြိတ်ပါ။ ဖလ်ဗူးတစ်ခုတွင် ထည့်ထားပါ။

အညွှန်း။ ၂ ပြားသားခန့်မှ ၃ ပြားသားအထိတိုက်ပါ။

မရိုးကို ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့၌ကုသပုံ

နူနာ

မရိုးပွင့်ကိုခူး၍ အရိပ်တွင်အခြောက်ခံပါ။ (တပင်တည်းမှ
ယူပါ) အမှုန့်ပြုပါ။

အညွှန်း။ ။ပထမနေ့တွင် ၃ပဲသား၊ ဒုတိယနေ့တွင် ၆ပဲသား၊
တတိယနေ့တွင် ၉ပဲသား၊ စတုတ္ထနေ့တွင် ၁၂ ပဲ
သား၊ သန့်စင်သော ရေတွင်းရေနှင့် ၃၇ ရက်
အထိ ဆက်တိုက်တိုး၍သောက်ပါ။ တဖန် ၃ ပဲ
၃ပဲစီလျှော့၍ ၃ပဲ ကျန်သည်အထိ သောက်ပါ။
ဆေးသောက်နေစဉ်အတွင်း ဂျုံနှင့် ကုလားပဲကို
သာ ထောပတ်နှင့်စားပါ။ အခြားမည်သည့် အ
ဟာရကိုမှမစားရ။ ရေကိုလည်း တခုတည်းသော
ရေတွင်းမှသောက်ပါ။ (ဤဆေးကို သောက်စဉ်
သွေးဝမ်းသွားတတ်သည်။ မကြောက်ပါနှင့်။)

ကာလသားရောဂါဆေး

မရိုးဆေးကိုမီးဖုတ်၍ မီးသွေးလုပ်ပြီးအမှုန့်ပြုပါ။ ၎င်းနှင့် အတူ သကြား(သို့မဟုတ်)နွားသောပတ်ကိုရောပါ။

အညွှန်း။ ။နေ့စဉ် ၆ပဲသားသောက်ပါ။ ၁၀ ရက် အတွင်း သက်သာသွားပါလိမ့်မည်။

ကာလသားရောဂါပျောက်ဆေးလုံး

မရိုးမြစ်ခေါက် ၁ ပဲ၊ ငြုတ်ကောင်း ၆ ပဲ၊ ဤ ၂မျိုးကို အမှုန့်ပြုလျက် ထန်းလျက် ၇ကျပ် ၈ပဲသားနှင့်ရောပါ။ ကုလား ပဲလုံးခန့် အလုံးကလေးများပြုလုပ်ပါ။

အညွှန်း။ ။ပထမဆုံးဝမ်းနုတ်ပြီးမှ ၁လုံးမှ ၂လုံးအထိ နေ့စဉ် သောက်ပါ။

သွားတိုက်ဆေး

မရိုးရွက်များကို အရိပ်တွင်လှန်းပါ။ အမှုန့်ပြုပါ။ ၎င်းနှင့် ဆတူ ငြုတ်ကောင်းကိုရောပါ။ ၎င်းကိုတိုက်ပေးပါက သွား များခိုင်၏။ သွားများလည်း ပုလဲသဖွယ်ဖြူစင်၏။

ဖနောင့်နာခြင်း

မရိုးပွင့်ကိုဖြူး၍ ဖနောင့်၌ စည်းပေးခဲ့သော် ဖနောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းပျောက်ကင်း၏။

အကြောရောဂ

မရိုးရွက် ၇ ရွက်၊ ထန်းလျက် ၃ ကျပ် ၁ ပဲ၊ ဤ ၂ မျိုးတို့ကို အမှုန့်ပြုလျက် တောဆီးသီးခန့် အလုံးများပြုလုပ်ပါ။ အညွန့်း။ ။နံနက်၊ ည ၁ လုံးစီရေအေးနှင့် သောက်ပါ။

လေတဂူ

၁။ မရိုးဝတ္ထံ

၃ ကျပ်သား

၂။ စမုန်ဖြူ

၃ ကျပ်သား

ဤ ၂ မျိုးကို ညက်စွာအမှုန့်ပြုပါ။ သကြား ၁ ကျပ် ၄ ပဲ သားနှင့်ရောပါ။ နေ့စဉ် ၁ ပဲသားခန့်ရေနှင့်သောက်ပါ။ လေတဂူ ကင်း၏။

မီးလောင်နှာ

ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အင်္ဂါကြီးငယ်တခုခု၌ မီးလောင်ခဲ့သော် မရိုးရွက်ကို မီးကင်၍အရည်ညှစ်ယူပါ။ မီးလောင်သောနေရာကို လိမ်းပါ။ ချက်ခြင်းသက်သာသွားပါလိမ့်မည်။

အကွက်ထခြင်း

ခြေလျင်များများ သွားခြင်းကြောင့် ခြေထောက်တွင် အကွက်များထလာတတ်ကုန်၏။ ဤရောဂါမျိုးတို့၌ မရိုးစေးကို လိမ်းပါ။ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းချုပ်ခြင်း

မရိုးမြစ်ကိုရေနှင့်သွေး၍ ဗိုက်၌ ခပ်ထူထူ လိမ်းပေးခဲ့သော်
ဝမ်းသွား၏။

မီးယပ်သွေးပေတီဆေး

၁။ မရိုးမြစ်

၂။ ငြုတ်ကောင်း

ဤ ၂မျိုးအမှုန့်ပြုပါ။ အလုံးပြုလုပ်ပါ။ ၂လုံးကိုရေနွေးနှင့်
သောက်ပါ။ မီးယပ်သွေးပေတီ၏။

သုငယ်နာဆေး

မရိုးရှာလဘတ်ရည်

မရိုးရွက်စိမ်းတို့ကို သတ္တုရည်ထုတ်ယူပါ။ ကောင်းစွာစစ်
ယူပါ။ ထိုမရိုးရွက်သတ္တုရည်၌ သကြား ၂ဆ ရောလျက် နည်း
လမ်းအတိုင်းရှာလဘတ်ရည်ပြုလုပ်ပါ။ အေးသောအခါ ပုလင်း
တွင် ထည့်ထားပါ။ (မပုတ်အောင်ထားရမည်)။

အညွှန်း။ ။ ပိန်၍အစားနည်းသော ကလေးငယ်ကို ဤအရည်
ကို တိုက်ခဲ့သော် ဝဋ်သန်မာလာ၏။ လွယ်ကူစွာ
သွားပေါက်၏။ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်တင်းရောင်
ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ပါးစပ်ကွဲ
ခြင်း၊ အဖုနာကလေးများထွက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုး
ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းစသော ရောဂါများ ပျောက်
ကင်း၏။

သောက်ရန်အတိုင်းအတာ

၆လသား	၂ စက်
တနှစ်	၄ စက်
၂ နှစ်	၆ စက်
၈ နှစ်	၈ စက်

နေ့အခါ၌ ၂ ကြိမ် ဥတုအားလျော်စွာ ရေအေးရေပူတို့နှင့်
တိုက်ပါ။ အခြောက်ကလေးများ မွေးတတ်သောမိခင်တို့အား
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်တွင် ၁၀ စက်စီ ည-မနက်တိုက်ပါ။

မှတ်ချက်။ ။ ဤရှာလဘတ်ရည်ကိုမိခင်နို့ ရည်ကိုမစို့ ရသော
သူငယ်များအား အနို့ယပြည်တွင်တိုက်ကြသည်။

ဝါဒီကရုဏာဆေးများ

မရိုးပင်ဖြင့် ဓာတ်ကြီး ဓာတ်ငယ် အသွယ်သွယ်နှင့် ရတနာ အမျိုးမျိုးတို့ကို လူတို့၏ ရသာယနဆေးအတွက် ပြာဆေးများ ကို စီမံပြုလုပ်နိုင်သည်ကို ဓာတ်ဆရာတိုင်းလိုလို သိရှိကြ၏။ ဤဓာတ်ပြာများဖြင့် မပျောက်နိုင်၍ လက်လျှော့နေရသော ရောဂါများ၊ မျှော်လင့်ချက်မရှိသော ရောဂါများကိုပင်ပျောက် ကင်းနိုင်သည်ကို တိုင်းရင်း ဆရာတိုင်း လိုလို ပင် သိရှိကြ၏။ သို့ရာတွင် မသိရှိသေးသော ဓာတ်ဆရာများ၊ တိုင်းရင်းဆရာ များနှင့် ပွင့်သစ်စ ဆရာများအတွက် မရိုးပင်နှင့် ဓာတ်စသည် တို့ကို ပြာချပုံနှင့် ထိုပြာများကို အသုံးချပုံများကို အကျဉ်း ချုပ်ရေးသားပေအံ့။

ငွေပြာ (၁)

ဇင်ရွေးဖြူ ၇ကျပ် ရှုစိပဲသားကိုမရိုးစေးတွင် ၃ကြိမ်စိမိပါ။ အခြောက်လှန်းပါ။ ထို့နောက် အမှုန့်ပြု၊ စီးအောင် နယ်ပါ။ မုန့်လုံးရေပေါ်ကဲ့သို့လုံပါ။ အတွင်းတွင် အလွန်ပါးလွှာသော

ငွေပြား ၁ ကျပ်သားကို ထည့်ပါ။ မီးသွေး ၁၀ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ဒုတိယအကြိမ် ဇင်ရွေးဖြူ ၇ ကျပ် ရှစ်ပဲသားကိုမရိုးစေးတွင်စိမ်ပါ။ အခြောက်လှန်းပါ။ ထို့နောက် အမှုန့်ပြု၊ စီးအောင် နယ်ပါ။ မုန့်လုံးရေပေါ်ကဲ့သို့ လုံးပါ။ အတွင်းတွင်အဆိုပါငွေပြားကိုထည့်ပါ။ မီးသွေး ၁၀ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၃ ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သော် ငွေပြားသည် ပွရွလာလိမ့်မည်။ အမှုန့်ပြုလျက် ဖလ်ဗူးတခုတွင်ထည့်ထားပါ။ အညွန့်။ ။ ဤငွေပြား ၂ ပြားသား (တစ်ရတီခန့်) ကိုထောပတ် ခဲနှင့်စားပါ။ ၀.၁ ဇီကရဏခေါ် သုက်ပွားဆေးဖြစ်၏။

ငွေပြာ(၂)

ငွေမှုန့် ၁၂ ပဲသားကို မရိုးစေး ၃ ကျပ်သားနှင့် ရောပြီး ကြိတ်ပါ။ မရိုးစေးအားလုံး ခြောက်သွားခဲ့သော် အလုံးကဲ့သို့ ပြုလုပ်လျက် လုံ သို့မဟုတ် အိုးတခုတွင်ထည့်ပြီး ဇော်မံပါ။ မီးသွေး ၇ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ ထို့နောက် ဒုတိယ အကြိမ်တွင် ၎င်းငွေမှုန့်ကို မရိုးစေး ၃ ကျပ်သားနှင့် ရောပြီး အမှုန့်ပြုပါ။ အလုံးကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါ။ လုံ သို့မဟုတ် အိုးတခုတွင်ထည့်ပြီးဇော် မံပါ။ မီးဖုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ မဲသော ငွေပြားကို ရပါလိမ့်မည်။ အမှုန့်ပြုလျက်ဖလ်ဗူးတခုတွင်ထည့်ပြီး သိမ်းထားပါ။

အညွန့်။ ။ ပြာ ၂ ပြားသားခန့် (၁-ရတီ) ကို ပျားရည်နှင့် ရောပြီးလျက်ပါ။ ချောင်းဆိုး ပန်းနာ၌ ကောင်း၏။ လေရောဂါလည်း အလွန်ကောင်း၏။

ကြေးနီပြာ (၁)

ကြေးနီမှုန့် ၃ ကျပ်သား (တဇဉ်းနှင့်တိုက်ပြီးအမှုန့်ပြုလုပ်ပါ)
ကို မကြေမွတတ်သော ဆုံအတွင်းထည့်ပြီး မရိုးစေးနှင့် ရော
ကြိတ်ပါ။ မရိုးစေးခြောက်သွားလျှင်ထပ်ပြီးထည့်ပါ။ ဤနည်း
အတိုင်း မရိုးစေးတပေါင်ကုန်သည်အထိပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်
အလုံးကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါ။ အိုးတလုံး သို့မဟုတ် လုံတလုံးတွင်
ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး ၁၂ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။
အလုံချမ်းသောအခါ (အေးသောအခါ) ထုတ်ယူပါ။

ဤနည်းအတိုင်း ၇ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ နူးညံ့၍ ဖြူသောပြာကို
ရသောအခါ ဖလံးဗူးတခုတွင် ထည့်ထားပါ။

အညွှန်း။ ။ ဆန်စေ့ ၂ စေ့ ခန့်မှ ၄ စေ့ ခန့်အထိ ထောပတ်ခဲ၊
သို့မဟုတ် ဒိန်ချဉ်နှင့် စားပါ။ သုက်ကို အလွန်
ပွားစေသည်။ ခေါင်းရွဲ့သော ရောဂါ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ
ကြီးငယ်တို့၌ လေမိသော ရောဂါ တို့၌ အလွန်
ကောင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ ကြေးနီပြာ ကောင်း မကောင်းကို သိရှိရန်အတွက်
ပြာအနည်းငယ်ကို ဒိန်ချဉ်တွင် ထည့်ပြီးကြည့်ပါ။
ပြာမကောင်းခဲ့သော် အညိုရောင် ဖြစ်လာသည်။
အခြားအရောင် ဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ပကတိ
အတိုင်း ရှိခဲ့သော်လည်းကောင်း ကောင်းသည်ဟု
သိပါ။

ကြေးနီပြာ (၂)

ဆေးဒန်း ၁၂ ပဲသား (အဝါရောင်)တွင် မရိုးစေးအနည်းငယ်စီထည့်ပြီး ကြိတ်ပါ။ မရိုးစေး ၃ ကျပ်သား ကုန်ခဲ့သော် (ခြောက်သွားရမည်) ကြေးနီကို အပြားကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါ။ ထိုအပြားတွင် အထက်ပါဆေးဒန်းကိုသုတ်လိမ်းပါ။ ထို့နောက် မရိုးရွက် ၁၅ ကျပ်သားကို ကြိတ်ချေ၊ အလုံးပြုလုပ်ပြီးအတွင်းတွင် ကြေးနီပြာကိုထည့်ပါ။ အပေါ်မှ အဝတ်ပတ်ပါ။ မြေကြီးတွင် တွင်းတူးလျက် (၈၀ပေ)နည်းဖြင့်ဖုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း မီးဖုတ်ပါ။ အညိုရောင်ပြာကို ရမည်(ပြာသည် ရွှေမွန်နေသည်) ၎င်းကို ဖလ်ဗူးတွင် သိမ်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ညအခါတွင် မျက်စဉ်း ခတ်ပါ။ တိမ်ရောဂါ၊ ကျောက် ရောဂါ ကြောင့် ရသော တိမ်သလာ ရောဂါပင် ၁၀ ရက်အတွင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဂဇပုဋ္ဌနည်း

တကိုက်၊ သို့မဟုတ်၊ တထောင့်ထွာခန့် အနက်၊ အကျယ် ချိုသော တွင်းတခုကိုတူးပါ။ ထိုတွင်း၏ထက်ဝက်တွင် မီးသွေးများဖြည့်ပါ။ ၎င်းအပေါ်တွင် လုံ သို့မဟုတ် အိုးတလုံးတွင် ဆေးပစ္စည်းထည့်ပြီးတင်ထားပါ။ ၎င်းအပေါ်တွင် မီးသွေးထည့်၍ မီးဖုတ်သည်ကို ဂဇပုဋ္ဌ နည်းဟုခေါ်၏။

ကြေးနီပြာ(၃)

ဤနည်းဖြင့် ကြေးနီကိုပြာချလိုလျှင် လူ ၆ ယောက် လိုသည်။ မရိုးပင်များရှိရာ တောသို့ သွားရမည်။

ပထမ မီးဖိုတခုကိုလုပ်ပါ။ အပေါ်မှသံအိုးတလုံးကို တင်ပါ။ ထိုအိုးအပေါ်မှာ သံအိုးတလုံးကိုထပ်တင်ပါ။ ထိုအပေါ် အိုးတွင် အပေါက်သေးသေး ဖောက်ပါ။ (မရိုးစေးကျရန် ဖြစ်သည်။) အောက်သံဒယ်အိုးတွင် ကြေးနီပိုက်ဆံပြားများကို စီထည့်ပါ။ အပေါ်အိုးတွင် မရိုးစေးကိုထည့်ပါ။ မရိုးစေးသည် အပေါ်အိုးမှ အောက်သံအိုးတွင်းသို့ တစက်စက် ကျနေ လိမ့်မည်။ မရိုးစေးကုန်တိုင်း ထပ်ထည့်ပါ။ သံဒယ်အိုး အနီးတွင် စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် နေ နှစ်ယောက်၊ ည နှစ်ယောက် ထားပါ။ နောက်နှစ်ယောက်က မရိုးစေးကို စုဆောင်းရမည်။ ဤနည်းအတိုင်း နှစ်ပတ်ပြုလုပ်ပါ။ ဖြူသော ကြေးနီပြာကိုရပါလိမ့်မည်။ ပုလင်းတွင် လုံခြုံစွာအမှုန်ပြုထားပါ။

အညွှန်း။ ။ဆန်စေ့ဝက်မှ ဆန်တစေ့အထိ ထောပတ်ခဲနှင့် သောက်ပါ။ အကောင်းဆုံး အားတိုးဆေးဖြစ်၏။ မျှော်လင်းခြင်းကင်းနေသော ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။ဤဆေးသည် အိန္ဒိယပြည် တောတောင်များတွင် တရားနှင့် ပျော်မွေ့နေထိုင်ကြသော ရသေ့များ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော နည်းဖြစ်သည်။ ရသေ့ကြီး

များ၏ ခါးကြားတွင် ထိုပြာကလေးများ ပါလာ
တတ်၏။ ကုသ၍မရသောလူနာများကို ပေးတတ်
ကြ၏။ အကယ်၍ ကြေးနီပြာချရာတွင် ပျက်စီးသွား
ပါက ပြာကို တရက်ပတ်လုံး မရိုးစေးနှင့် ထပ်
ကြိတ်ပါ။ အိုးသို့မဟုတ် လုံတွင်ထည့်ပြီး ဇော်
သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး ၂ ပိဿာခန့်နှင့်ဖုတ်ပါ။ အေး
သောအခါ ထပ်မံပြီးပြုလုပ် ဖုတ်ပါ။ ဒိန်ချဉ်တွင်
ထည့်ကာ အရောင်မပြောင်းခဲ့သော် အောင်မြင်ပြီ
ဟု မှတ်ပါ။

သံမဏိပြာ(၁)

သံမဏိမှုန့် ၁၂ ပဲသားကို စဉ့် အိုး တ လုံး တွင် ထည့်ပြီး
အပေါ်မှ မရိုးစေး ၃ ကျပ်သားကိုထည့်ပါ။ အိုးကိုဖုံးထားပါ။
ဤနည်းအတိုင်း ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်၍ မရိုးစေးကို အခြောက်ခံပါ။
အားလုံး မရိုးစေး ၉ ကျပ်သားကုန်ရမည်။ ထို့နောက် မရိုးရွက်
၁၂ ရွက်နှင့်ရစ်ပတ်ပြီး လုံတခုတွင်ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ်မံပါ။
ထို့နောက် မီးသွေး ၄ ပိဿာနှင့် တွင်းတခုတွင်ထည့်ပြီး ဖုတ်
ပါ။ သံမဏိပြာကို ရပါလိမ့်မည်။

အညွှန်း၊ ။ ၂ ပြား (တစ်ရတီခန့်) သား ကို ထောပတ်ခဲနှင့်
သောက်ပါ။ သွေးအား ရှိ၏။ ခွန်အား တိုး၏။
အလွန် စွမ်းအားကောင်း၏။

သံချေးပြာ (၁)

မရိုးမြစ်တပေါင်ကို မြေကြီး စသည်တို့မှ ကင်းစင်အောင်
လုပ်ပါ။ အမှုန့်ပြုပါ။ မရိုးစေးတွင်စိမ့်၍ အခြောက် လှန်းပါ။
ထို့နောက်အိုးတလုံးတွင် အောက်က ဖြန့်ထားပါ။ အပေါ်က
သံချေး၇ကျပ် ၈ ပဲသားထည့်ပါ။ ၎င်း၏ အပေါ်မှမရိုးခေါက်ကို
တတ်နိုင်သရွေ့ ထည့်ပါ။ အိုးကို နေသရွတ် မှပ်ပါ။ မီးသွေး
၁၆ပိဿာနှင့် မီးဖုတ်ပါ။ ၁၀ နာရီ သို့မဟုတ် ၁၅ နာရီ
တွင် ပြာကျ၏။

အညွှန်း။ ။ ရွေး ၂ စေ့ ခန့်မှ ရွေး ၄ စေ့ ၁ ပဲသားခန့် အထိ
ဒိန်ချဉ်နှင့်သောက်ပါ။ အသည်းရောဂါ၊ အစာအိမ်
ရောဂါ၊ ဝမ်းဗိုက် ရောဂါ၊ နာတာရှည်ဝမ်းပျက်
ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ ကိုယ်ရေဖျော့ရောဂါ၊
စသည်တို့၌ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ ဤဆေးသည် အသည်းရှိသွေးကို အလွန်တိုးပွား
စေ၏။ သံချေးသည် ဟောင်းလေ ကောင်းလေ
ဖြစ်၏။ သံပိုးများတွင် ရရှိနိုင်၏။

သံချေးပြာ (၂)

သံချေးများကို အမှုန့်ပြုပါ။ အရောင် တောက်လာအောင်
ရေဆေးပါ။ ၎င်းကို ၃ ကြိမ်မရိုးစေးနှင့်စိမ့်ပါ။ အခြောက်ခံပါ။
ထို့နောက်အိုးတလုံး သို့မဟုတ် လုံးတခုတွင်ထည့်ပြီး နေသရွတ်
မှပ်ပါ။ ထို့နောက် မီးသွေး ၈ ပိဿာနှင့်မီးဖုတ်ပါ။ အေးသော

အခါ ထုတ်ယူလျက် မရိုးစေးနှင့် တနေ့လုံးကြော်ပါ။ ဤနည်း အတိုင်း ထပ်ခါ ထပ်ခါပြုလုပ်လျှင် နူးညံ့သောသံချေးပြာကို ရ၏။

အညွှန်း။ ။၁ ရွေးသားခန့် တိုက်ပါ။ အသည်း ရောဂါများ အတွက် အလွန်ကောင်း၏။

ခဲပြာ

ခဲကို အရည်ဖျော်၍ ထောပတ်တွင် ၇ကြိမ်ငြိမ်းသတ်ပါ။ ထို့နောက် သန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပြီး သံဒယ်အိုးတွင် ထည့်ပါ။ မီးပေါ်တင်ပါ။ ခဲသည် ပျော်သွားခဲ့သော် လတ်ဆတ်သော မရိုးမြစ်နှင့်မွေပါ။ ၄နာရီ ကြာသောအခါ ဝါသောအရောင် ရှိသော ပြာကို ရရှိပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုစစ်၍ ၎င်းနှင့်ဆတူ ဖာလာငယ်မှုန့်နှင့်ရောပါ။

အညွှန်း။ ။ရွေး စေ့ခန့် တိုက် ပါ။ ဆီးရောဂါ အမျိုးမျိုး၌ ကောင်း၏။ အထူးသဖြင့် ဂနိုးရီးယား၌ကောင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ခဲ၊ အင်၊ ပြဒါး၊ ဟင်းခိုင်းများသည် ဓာတ်ပြာသေမှု စားသင့်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက လူကိုအန္တရာယ် ပြုတတ်ပါသည်။ လိမ်းဆေးအဖြစ်နှင့်သာ သုံးကြပါ သည်။ သေ မသေသိလိုပါက ပြာကို လုံ့နှင့်ပြန်၍ ထိုးကြည့်ပါ။ မူလ ပြန်လာလျှင် မသေဟု သိပါ။ ပြန်လည်ပြာချပါ။

ဘင်နှင့်နာပြာ

ဘင်နှင့်နာပြာမျိုးကို ဆတူယူပါ။ မြေအိုးတွင်ထည့်ပြီး မီးပေါ်တွင်တင်ပါ။ ပျော်သောအခါ လတ်ဆတ်သော မရိုးမြစ်နှင့် မွေပါ။ မီးပြင်းထည့်ပါ။ အားလုံး ပြာ ကျသော အခါ ချ၍ လုံတလုံးတွင်ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး ဂုပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ အဝါရောင် ပြာရ၏။

အညွန့်။ ။ တရွေးမှ ၂ ရွေးအထိ ထောပတ်ခဲနှင့် သောက်ပါ။ ဆီးများ၏၊ တစက် တစက်သွားသော ဆီးရောဂါ မျိုး၌ကောင်း၏။

ဟင်းရိုင်း

ဟင်းရိုင်းကို ဆေး ဆရာတိုင်း သိကြ၏။ နည်းလမ်းကျစွာ ပြုလုပ်စီမံထားသောဟင်းရိုင်းပြာသည် အင်္ဂါကြီးငယ်ချို့ ယွင်းလွှားအောင် ဖြတ်ထားသော အဒွန် မည်သော လေရောဂါ၊ ခေါင်းရွှဲ သွားသော အဒွန်တမည်သောလေရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ပန်းနာရောဂါ၊ တုန်လှုပ်သော ကမ္မမည်သော လေရောဂါ၊ အစာအိမ်ရောဂါ၊ ဆီးအိမ်၌ ဖြစ်သောရောဂါ၊ ကာလသားရောဂါစသည်တို့၌ အလွန်ကောင်းသည်။ အထူးအားဖြင့် ဦးကျောက်နှင့်အကြောများကို အလွန် အားကောင်းစေတတ်သည်။ ထို့ပြင် ပန်းသေရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေသည်။ မျက်နှာအရောင်အဆင်းကို တောက်ပစေသည်။

ဤ၌ မရိုးပင်ဖြင့် ဟင်းရိုင်းကို ပြာချနည်းကို ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဟင်းရိုင်းပြာချရာ၌ သတိရှိစွာ ဂရုစိုက်၍ပြုလုပ်

ရမည်။ အကြောင်းမူ ဟင်းရိုင်းတွင် ကန့်နှင့်ပြဒါးများ ရောနှော
နေသောကြောင့် သတိမထားပဲပြုလုပ်ခဲ့သော် အဆိုပါ ဓာတ်
များသည် ချက်ခြင်းထွက်သွားတတ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
ပြာကိုလည်းမရဖြစ်တတ်သည်။ ရပြန်သော်လည်း အနည်းငယ်
သာရမည်ဖြစ်သည်။

ရသာယန(အသက်ရှည်) ဆေးကိုဖော်စပ်ကြသော ဓာတ်
ဆေးဆရာတို့သည် ဟင်းရိုင်းပြာမှတစ်ပါး အစိမ်းသက်သက်ဖြင့်
ဖော်စပ် ကြ သေး ၏။ ၎င်းကို “ဟရိ တာ လမောမိယာ” ဟု
ခေါ်ကြ၏။ ထိုမှတစ်ပါး “ဟရိတာလတေလ” ခေါ် ဟင်းရိုင်းဆီ
များကိုထုတ်ယူကြသေး၏။

ဟင်းရိုင်းပြာ (၁)

ဟင်းရိုင်း ၁၂ ပဲယားကိုမရိုးစေးနှင့်ကြိတ်ပါ။ မရိုးစေးကုန်
သွားခဲ့သော် နောက်ထပ် ထည့်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း မရိုးစေး
အနည်းဆုံး တပေါင် ကုန်သည်အထိ ပြုလုပ် ပါ။ မရိုးစေးနှင့်
၃ ကြိမ်တိတိ စိမ်ထားသော တမိုက်လောက်ရှိသော အဝတ်စ
တခုနှင့်အပေါ်မှ ရစ်ပတ်ထားပါ။ ထို့နောက်ချည်၆ကျပ်သား
နှင့် ထပ်ရစ်ချည်ပါ။ မြေအိုးတခုတွင်ထည့်ပါ။ လေမတိုက်သော
နေရာတခုတွင် အဆိုပါအိုးကိုမီးဖုတ်ပါ။ သင့်တော်ပြီထင်သော
အခါ အအေးခံလျက် အပေါ်မှချည်ပြာကို ပြေးပြေးခွါယူပါ။
အတွင်းတွင် ပြာကို ရပါလိမ့်မည်။

အညွှန်း။ ။ ၁ ရွေးခန့် ထောပတ်ခဲ သို့မဟုတ် မလိုင်နှင့်
ကျွေးပါ။ (ဝါဇီကရဏ) သုတ်ကို ပွားစေ၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါပျောက်ကင်း၏။ မျက်နှာအရောင်
အဆင်းတောက်ပ၏။

ဟင်းရိုင်းပြာ (၂)

ဟင်းရိုင်း ၁ ကျပ်သားကို ၃၆ နာရီ အထိ မရိုးစေးနှင့်
ကြိတ်ပါ။ အပြားကလေးများ ပြုလုပ်ပြီး အရိပ်တွင် လှန်းပါ။
မြေအိုးတခုတွင် ဆူးဖြူခေါက်မှုန့် ၇ ကျပ် ၈ ပဲသားထည့်ပြီး
အပေါ်မှ အဆိုပါ ဟင်းရိုင်းပြားကလေးများ ထည့်ပါ။ မြေ
အိုးကို ဖော်သရွတ်မံပါ။ အခြောက်ခံပါ။ ထို့နောက် မီးသွေး
၂ ပိဿာနှင့် မီးဖုတ်ပါ။ အလွန် ကောင်းသော ပြာကို ရပါ
လိမ့်မည်။

အညွှန်း။ ။ ရွေးစေ တဝက်မှ တရွေးအထိနွား နို့ နှင့်သောက်
ပါ။ ဝါဇီကရုဏာဆေးဖြစ်၏။ တုန်လှုပ်သော လေ
ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ကိုက်ရောဂါ၊ အအေးကြောင့်
ဖြစ်သော ရောဂါများအတွက် ကောင်း၏။

ဟင်းရိုင်းပြာ (၃)

ခပေါင်းကြီးမှုန့် ၇ ကျပ် ၈ ပဲသားကို မရိုးစေးနှင့် စေးကပ်
သည်အထိ ကြိတ်ပါ။ ထုင်း၏ အလယ်တွင် ဟင်းရိုင်း ၁၂ ပဲ
သားကိုထည့်ပါ။ မြေအိုးတလုံးတွင် ထည့်ပိတ်ပြီး ဖော်သရွတ်
မံပါ။ အခြောက်လှန်းပါ။ မီးသွေး ၁ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ ပြာကို
ရပါလိမ့်မည်။

အညွန့်။ ၊အလွန်ကောင်းသော ဝါဇီကရဏ ဆေး ဖြစ်၏။
 အကြောများကို အလွန်အားရှိစေ၏။ အစာအိမ်ကို
 အားရှိစေ၏။ ထောပတ်နှင့်နို့ ကိုကျညက်စေလျက်
 ဝမ်းဗြူးစေတတ်၏။ မျက်နှာ အရောင် အဆင်း ကို
 ကောင်းစေတတ်၏။

အတိုင်းအတာ။ ။ရွေးစေ ဝက် ခန့် ကို ထောပတ်ခဲနှင့်
 သောက်ပါ။

ဟင်းရိုင်းပြာ (၄)

ဟင်းရိုင်း ၁၂ ပဲသားကို မရိုးရွက်ဝါများနှင့် ရစ်ပတ်လျက်
 လုံ၊ သို့မဟုတ် အိုးတခုတွင်ထည့်ပါ။ အရွက်များမီးလောင်လှ
 နီးပါးအထိ မီးရှို့ပါ။ သို့ရာတွင် ဟင်းရိုင်းကိုမီးမလောင်စေရ။
 ဤနည်းအတိုင်း ၂ကြိမ် ပြုလုပ်လျှင် ဟင်းရိုင်းပြာရ၏။

အညွန့်။ ။ရွေးစေ ဝက် ၁ ရွေးအထိနွားနို့ နှင့်သောက်ပါ။
 ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ အဆစ်ရောင်ကိုက်၊ ပန်းသေ
 ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဟင်းရိုင်းပြာ (၅)

မရိုးရွက်များကို ကတော့ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါ။ ထိုကတော့တွင်
 ဟင်းရိုင်း ၁၂ ပဲသားကိုထည့်ပါ။ မရိုးစေးကိုပါထည့်ပါ။ ဤနည်း
 အတိုင်း ၃ရက်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် အခြောက် လှန်းပါ။
 ခြောက်သွားခဲ့သော်ကတော့နှင့်တကွသောဟင်းရိုင်းကိုမရိုးရွက်
 ရင့်ရင့်၇ပီသော ငါးဆယ်ကိုအထက်အောက်ညှပ်လျက် မြေအိုး၊

သို့မဟုတ် လုံကြီးကြီးတခုတွင် ထည့်ပိတ်ပါ။ မီးဖုတ်ပါ(မီးပြင်း ၁၂ နာရီအထိ ဖုတ်ပါ)။ အလို ချမ်းသော အခါ ဟင်းရိုင်းကို ထုတ်ယူပါ။ ထို့နောက် အသားမှုန့် (ကြက်သား၊ အမဲသား စသည်) ၃ ကျပ် ၁၂ ပဲသားနှင့် လုံး၍ နွားထောပတ် ၃ ကျပ် ၁၂ ပဲသားနှင့်ကြော်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၂၁ ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။ ပြာဖြစ်၏။

အညွှန်း။ ။ ဤပြာကို ရွေးစေ့ဝက်မှ ၁ ရွေးအထိ ၂၁ ရက်မျှ စားခဲ့သော် အနှစ် ၄၀ အထိ ပိုမို အားကိုရှိစေ၏။ ပန်းနာရောဂါ၌ အလွန် ကောင်း၏။

ဟင်းရိုင်းပြာ (၆)

ဟင်းရိုင်း ၁၂ ပဲသားကို မရိုးစေး ၇ ကျပ် ၈ ပဲသားနှင့်ကြိတ်၍ အလုံးကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါ။ ယင်းကို မြေအိုးသေးသေး နှစ်လုံးတွင် ထည့်ပြီး ဇော်မံပါ။ အရိပ်တွင်လှန်းပါ။ ထို့နောက် အဖုံးမပါ သော စည်ပိုင်းပြတ်တခုတွင် သဲငါးပိဿာထည့်ပါ။ ထိုသဲတွင် မြေအိုးများကို ထည့်ပါ။ ထို့နောက် အဖုံးပိတ်ပါ။ မီးဖိုပေါ် တင်ပါ။ ညောင်သားနှင့်မီးဖုတ်ပါ။ ထင်း ၃၁ ပိဿာကုန်သည် အထိ ပြုလုပ်ပါ။ အေးသောအခါ ပြာကို သတိနှင့်ထုတ်ယူပါ။ (ပြာဖြူကိုရမည်)။

အညွှန်း။ ။ ရွေးစေ့ဝက်မှတရွေးအထိထောပတ်ခဲ၊ သို့မဟုတ် မလိုင်နှင့် သောက်ပါ။ ပန်းသေ ရောဂါ၌ အလွန် ကောင်း၏။ ပန်းနာရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ အင်္ဂါကြီးငယ်များကို ဖြတ်တတ်သော အဓွန့်မည်

သောလေရောဂါ၊ ခေါင်းရွဲ့ကတ်သော အဓွတ်
မည်သော လေရောဂါနှင့် သလိပ် အဖွဲ့အစည်း
ကြောင့်ဖြစ်ကတ်သော လေရောဂါများ၌ အလွန်
ကောင်း၏။

ယင်းခိုင်းပြာ (၇)

မရိုးပင် အမြစ်ဟောင်း တခုတွင် အပေါက် ဖောက်မပါ။
ဟင်းတွင်ဟင်းခိုင်း၍ ကျပ်သားကိုထည့်ပါ။ အပေါက် ဖောက်
စဉ်က ရရှိသော မရိုးမြစ် ၈ များကို ပြန် သိပ် ပြီး အပေါ်မှ
ချည်ကြမ်းစဖြင့် ၂ ခါပတ်ပါ။ အပေါ်မှ မြေပြန်ဖုံးပါ။ တနှစ်
ကြာသောအခါ မရိုးပင်ကိုနှုတ်ယူပါ။ ယင်းတွင် ဝါဂွမ်းနှင့်
မြေကြီးဖြင့်လိမ်းပါ။ ထိုအပေါက်၏ ရှေ့နှင့် နောက် အနည်း
ငယ် ချန်ထားလျက်ဖြတ်ပါ။ ထို့နောက် အိုးတွင် ထည့်ပါ။
ဖော်သရွတ်မံပါ။ ခြောက်သောအခါ နောက်ထပ် အိုးတလုံး
တွင်ထည့်၊ ထပ် ဖော်သရွတ်မံပါ။ (အိုး ၂ ထပ်) တွင်းတခုကို
တူးပြီး လေမတိုက်သော နေရာတွင် မီးသွေး ၁၀ ပိဿာ၊
သို့မဟုတ် ၁၀ ပိဿာနှင့် မီးဖုတ်ပါ။ ရေခဲကဲ့သို့ဖြူသောပြာကို
ရရှိပါမည်။

အညွန့်း။ ။ ဆန်စေ့ တစေ့မှ နှစ်စေ့ အထိ ထောပတ်ခဲနှင့်
စားပါ။ ပန်းသေရောဂါကောင်း၏။ အကြောများ
အားရှိစေ၏။ မပျောက်ကင်းတော့ပြီဟု လက်လျှော့
ထားသောမန်းသေရောဂါများပင်ပျောက်ကင်း၏။
အဖိုးအိုများစားလျှင်ငယ်မှုပြန်၏။

ဟင်းရိုင်းပြာ (ဂ)

ဟင်းရိုင်း ၃ ကျပ်သားကို ၃ ပိဿာမှစ၍ ၃၁ ပိဿာ အထိရှိသော မရိုးစေးတွင် အစေးအလယ်တွင် မှန်ထုတ်ဆွဲလျက် မီးညှင်းညှင်းဖြင့်ချက်ပါ။ ထို့နောက် ထုတ်ယူလျက် ၈ ရက် အထိ မရိုးစေးအနည်းငယ်စီ ထည့်ပြီး ကြိတ်ပါ။ ထို့နောက် အလုံး လုံးပါ။ ထို့နောက် ဖြူသောအရောင်ရှိသော ကြက်ဥခွံ ပြာ ၆၀ ကျပ်သားနှင့် မရိုးစေးကိုကြိတ်ပါ။ ၎င်း၏ အလယ် တွင် အဆိုပါ ဟင်းရိုင်းကို ထားပါ။ အပေါ်မှ အဝတ်ဖြင့် ရစ်ပတ်ဖော်မံပါ။ အခြောက်လှန်းပါ။ မီးသွေး ၂၅ ပိဿာနှင့် မီးဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ ကြက်ဥခွံပြာတို့ကို ထုတ်ပစ်ပါ။ ဖြူသော ဟင်းရိုင်းပြာကို ရမည်။

အညွှန်း။ ။ဆန်စေ့ တစေ့ ခန့်မှ နှစ်စေ့ ခန့်အထိ ထောပတ်ခဲ၊ သို့မဟုတ် မလိုင်နှင့်သောက်ပါ။ သုက်ကို အလွန် ပွားစေ၏။ ပန်းသေရောဂါတို့၌အလွန်ကောင်း၏။ ဝါဇီက ရုဏ်ဆေးများ အနက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ စွဲစားပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင် လျှပ်စစ် ကဲ့သို့စွမ်းအားရှိလာမည်ဟု အံ့နွှယ်ပြည်ရှိ ရသေ့ ကြီးများက ဆိုကြ၏။

ဟရိတာလမောမိယာဆေး

ဟရိတာလမောမိယာခေါ် ဟင်းရိုင်းအစိမ်းသက်သက်ဖြင့် ပြုလုပ်သောဆေးများကို ဓာတ်ဆေးဆရာတို့က ဟင်းရိုင်းပြာ

ထက်ပင်ကောင်းသည်ဟုယူဆကြ၏။ အကြောင်းမူ ဟင်းရိုင်း၏ သဘောတရားသည် သက်ရှိ သတ္တဝါတို့သာမက သက်မဲ့ ပစ္စည်းများကိုပါ အစွမ်းသတ္တိရှိစေတတ်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်၏။

ဟရိတာလမောမိယာ (၁)

ဒုတ္တာပြာ ၁၂ ပဲသားကို မရိုးစေးတပေါင်နှင့် တပတ်အထိ စိမ်ထားပါ။ မရိုးစေးသည်ကွဲသွားလိမ့်မည်။ ထို့နောက် စစ်ပါ။ နောက် ဟင်းရိုင်းနီသက်သက်ကို မြေအိုးတလုံးတွင် ထည့်ပါ။ မီးညှင်းညှင်းပေးပါ။ အပေါ်မှ ဒုတ္တာရောနေသော မရိုးစေးကို အနည်းငယ်စီထည့်ပေးပါ။ ဟင်းရိုင်းအားလုံး အညီအညွတ် ဖြစ်သောအခါ ချပါ။ (ပြာမဖြစ်ပဲ ချသည်)။

အညွှန်း၊ ။ ဆန်စေ့ တစေ့ ခန့်မှ ၂ စေ့ ခန့်အထိ ထောပတ်ခဲ သို့မဟုတ် မလိုင်နှင့်စားပါ။ ဝါဇီကရုဏာ ဆေး ဖြစ်၏။ ပန်းနာချောင်းဆိုး စသည် တို့ ၌ လည်း ကောင်း၏။

ရသာယန(အသက်ရှည်)ဆေးများ

ဟရိတာလမောမိယာ

ဟင်းရိုင်း ၃ကျပ်သားကို သံဒယ်အိုးတလုံးတွင် ထည့်ပါ။
မရိုးစေးတပေါင်ကိုထည့်ပြီး မီးညှင်းညှင်းဖြင့် မရိုးစေး ကုန်
သည်အထိချက်ပါ။ ထို့နောက် ဟင်းရိုင်းကိုထုတ်ယူပြီး ဖလ်
ခွက် သို့မဟုတ် ပန်းကန်တခုတွင်ထည့်ပြီး ညအခါတွင် ဆီးနှင်း
တွင် ထားပါ။ မနက်တွင် ဖယောင်းသဖွယ် တွေ့ရှိရမည်။
ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။

အညွန့်။ ။ အရေပြား၌ အကွက်များရှိသော်လည်းကောင်း၊
ထိုနေသော်လည်းကောင်း ပွတ်လိမ်းပါ။ တိုက်
လည်းတိုက်ပါ။ နေ့စဉ်စွဲစားခဲ့သော် ညှင်းများ၊
တင်းတိတ်များ ပျောက်ကင်း၏။ ထို့ပြင် ဆန်စေ့
ဝက်မှ ဆန်စေ့ တစေ့ အထိ သောက်ခဲ့သော် မန်း
သေ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အားနည်းသူပင်
မိန်းမ ၄ယောက် ယူနိုင်စွမ်းရှိ၏။

ဟင်းရိုင်းဆီထုတ်ယူပုံ

ဟင်းရိုင်း ၁၂ ဝဲသားကို မရိုးစေးနှင့် ၅ ရက်ကြိတ်ပါ။ ထို့နောက် စင်ကြယ်သောဖယောင်း ၃ ကျပ်သားကို အရည်ဖျော်ပါ။ ထင်းတွင် ဟင်းရိုင်းကိုရောပါ။ ၂ မျိုးရောနှောသွားသည့်အထိ မီးညှင်းညှင်းဖြင့်ချက်ပါ။ ထို့နောက် ဖလ်ဗူးတစ်ခုတွင် ထည့်ပါ။ ဝါဂွမ်းနှင့် ရောထားသောမြေနှင့် လိမ်းကျံပါ။ ထို့နောက် အပေါ်မှဖလ်ဗူးတစ်ခုကို မှောက်ဖုံးပါ။ စည်ပိုင်းပြတ်တစ်ခုတွင် သဲကိုခင်းပါ။ မီးသွေးကို တလက်မထူအောင် ထည့်ပါ။ မီးသွေးများကို မီးရှို့ပါ။ သဲသည် အလွန် ပူလာလိမ့်မည်။ အတွင်း၌ ဖယောင်းရော၍ထည့်ထားသော ဖလ်ဗူးကို သံဒယ်အိုးရှိ သဲ ပေါ် ၌ ထားပါ။ နောက် ဖလ်ဗူးတစ်ခုကို အပြင်၌ထားပါ။ ဟင်းရိုင်းဆီသည် မရိုးစေးကဲ့သို့ စီး၍ အခြားဖလ်ဗူးတွင် ကျလာလိမ့်မည်။ ဟင်းရိုင်းအားလုံး ဆီအဖြစ်ဖြင့်ကျလာသောအခါ မီးငြိမ်းလိုက်ပါ။ အေးသောအခါ ဖလ်ဗူးတွင် ကောင်းစွာသိမ်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ ၈ စက်မျှကို နံနက်အခါ၌ ထောပတ်ခဲနှင့်ရောပြီး စားပါ။ သို့မဟုတ် ၅ စက်မျှ နွားနို့ ပူပူတပေါင်နှင့် ရော၍သောက်ပါ။ ဓာတ်အားကုန်ခမ်းခြင်း၊ သုတ်လွတ် မြန်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ပန်းသေခြင်းတို့၌ အလွန်ကောင်း၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့၌ ကောင်း၏။

နံဘေးအောင်သော ရောဂါ၌ ၅ စက် မျှကို ထောပတ်ခဲနှင့် ရော၍ ပွတ်လိမ်းပါ။ အပေါ်မှ ကြက်ဆူရွက် သို့မဟုတ် ကွမ်းရွက် သို့မဟုတ် ဝါဂွမ်းကို ကပ်ပေးပါ။ ချက်ခြင်းသက်သာသွားမည်။ အလွန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်သော ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ပန်းနာရောဂါတို့ကို တစက်မျှကို ကွမ်း ရွက် နှင့် ရောတိုက်ပါ။ အလွန်အံ့သြဖွယ် ပျောက်ကင်းသွားသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

ဆေးဒန်းပြာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ

ဆေးဒန်းပြာ၏ အကျဉ်းချုပ်အကျိုးကျေးဇူးမှာ အအေးမိခြင်း၊ အအေးကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ၊ သလိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ဝက်ရူးရောဂါ၊ သွက္က ၂၁ ပါတ၊ စောင်းရွဲ့သောလေရောဂါ၊ တုန်လှုပ်သော လေရောဂါ၊ နှာစေးရောဂါ၊ နာတာရှည်အဖျားရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်ကုန်၏။

ဆေးဒန်းပြာ(၁)

ဆေးဒန်း ၁၂ ပိဿာကို ဆုံထွင်ထည့်ပြီး အနည်းငယ်စီ၊ အနည်းငယ်စီ မရိုးစေးတပေါင်ကျန်သည်အထိ ထည့်ကြိတ်ပါ။ ထို့နောက် အဝတ်စတုခုနှင့်ပတ်ပါ။ ၃ ကြိမ် မရိုးစေးတွင်

ဆိပ်လျက် အခြောက်ခံပါ။ ထို့နောက် ချည် ဇွဲကျပ်သားနှင့် ရစ်ပတ်ပါ။ လုံသောနေရာ၌ မီးဖုတ်ပါ။ အေးသော အခါ ထုတ်ယူပါ။

အညွှန်း။ ။ ဆန် ၄ စေ့မျှ မလှိုင်နှင့်သောက်၊ သလိပ်နှင့်ပတ် သက်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

ဆေးဒန်းပြာ(၂)

ဆေးဒန်းပြာ ၁၂ ပဲသားကို ၄ ရက်အထိဆက်၍ မရိုးစေး နှင့် ကြိတ်ပါ။ အပြားကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။ အရိပ်တွင် အခြောက်လှန်းပါ။ အုတ်သစ် ၂ ခုကို အလယ်တွင်အနည်းငယ် ထွင်း၍ အဆိုပါ ဆေးဒန်းလုံးကလေးများကိုထည့်ပါ။ အုတ် ၂ ခုကိုထွင်းထားသော ဘက်ချင်းအပ်ပါ။ ဇော်မံပါ။ အခြောက် လှန်းပါ။ ထို့နောက် လေမတိုက်သောနေရာတခုတွင် မီးသွေး ၃ ပိဿာနှင့် မီးဖုတ်ပါ။ ပြာကျသွားပါလိမ့်မည်။ (ပြာအညို ရသည်)။

အညွှန်း။ ။ ရွေးစေ့ခန့်ကို ကွမ်းရွက်ဖြင့်သောက်ပါ။ ပန်းနာ ချောင်းဆိုးနှင့် သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါ များအတွက် ကောင်း၏။

ဆေးဒန်းပြာ(၃)

ဆေးဒန်း ၁ ကျပ် ၄ ပဲသားကို မရိုးစေး ၇ ကျပ် ၈ ပဲသားနှင့် နှေ့စဉ်ကြိတ်ပါ။ ၅ ရက် ကြာသောအခါ အပြားကလေးပြု

လုပ်၍ နေပူတွင် အဝတ်တခုပေါ်တင်ပြီး လှန်းပါ။ (တဖက်မှ တဖက်သို့ ပြောင်းပါ)။ ထို့နောက် ညောင် ရွက် ပြာတဆယ်ကျပ်သား၏အလယ်တွင်ထားပါ။မီးသွေး ၂ ပိဿာနှင့် လေမတိုက်သောနေရာတွင် ဖုတ်ပါ။ အနီရောင်သန်းလာသော ဖြူသောပြာကိုရမည်။ အမှုန့်ပြုလျက် ပုလင်းတခုတွင် ထည့်ထားပါ။

အညွှန်း၊ ။ရွေးစေ့ . တဝက်မှ တ ရွေး အ ထိ ကွမ်းရွက်။ သို့မဟုတ် သကြားနှင့် စားပါ။ အအေးမိခြင်းနှင့် သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၌ကောင်း၏။
အထူးသဖြင့် တုန်လှုပ်တတ်သောလေ၊သွက္ခ ၂၁ ပါတလေ၊ စောင်းရွဲ့တတ်သော လေရောဂါ။ ချောင်းဆိုး၊ နာတာရှည် အ ဖျားရော ဂါ တို့၌ ကောင်းလှ၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏၊ ဆာလောင် မွတ်သိတ်စေတတ်၏။

ဆေးဒန်းပြာ (၄)

ကင်ပွန်းခေါက်နှင့် ကင်ပွန်းသီး အဆံတပေါင်ကို အမှုန့်ပြုပါ။ မရိုးစေးတပေါင်နှင့် ကြိတ် ပါ။ ၎င်း အ တွင်း တွင် ဆေးဒန်း ၁၂ ပဲသားထည့်ပါ။ အပေါ်မှ အဝတ်ထူထူပတ်ပါ။ (အဝတ်ကို ၆၀ ကျပ်သားအထိပတ်ပါ)။ လေ မတိုက်သော နေရာတွင်ထားပါ။ မီးကျိုးခဲများကို အပေါ်မှ အုပ်ပါ။တဖြေးဖြေး မီးလောင်လျက် အေးသွားလိမ့်မည်။ အေးသောအခါ ပြာကိုထုတ်ယူပါ(ပြာဖြူရသည်)။

မှတ်ချက်။ ။ပြာအနည်းငယ်ကို မီးခဲကွင် ထည့် ကြည့် ပါ။
အကယ်၍ အခိုးမထခဲ့သော် ပြာကောင်းသည်ဟု
မှတ်ပါ။

အညွှန်း။ ။ဆန်စေ့ ၂ စေ့ ခန့်မှ ၄ စေ့ ခန့်အထိ ယောပတ်ခဲ
နှင့်သောက်ပါ။ ယားယံခြင်း၊ အဖု အနာများကို
ပျောက်ကင်းစေ၏။ ပန်း သေ ရောဂါ၌ အလွန်
ကောင်း၏။ သုက်ကိုများစေ၏။

ဟရိတာလမောမိယာ (ဆေးဒန်းဖယောင်းဆေး)

၁၂ ပဲသား စီးသော ဆေးဒန်း ၄ တုံးကို ယူပါ။ ၎င်း၏
အောက်အထက်တွင် မရိုးရွက် ၄ ရွက်စီထားပါ။ သံကြိုးနှင့်
ချည်ပါ။ တပေခန့်နက်၍ တပေ ခန့် ကျယ်သော တွင်းကို
လှည်းဘီးပုံသဏ္ဌာန်တူးပါ။ ထိုတွင်းကို ဆိတ်ဆိတ်ဖြင့် ဖြည့်ပါ။
ထို့နောက် တဘက် တဘက်မှ မီးရှို့ပါ။ အချို့ ဌာနတို့တွင်
မီးခဲကျန်လျက် အခိုး အငွေ့များ ရပ်သွားခဲ့သော် ယခင်
ဆေးဒန်းထုတ်ကိုထည့်ပေးပါ။ အရွက်များ ခြောက်ရုံ ခြောက်
သွားရမည်။ မီးမလောင်စေရ။ ထိုအခါမှာ ထုတ်ယူလျက်
ဆေးဒန်းတုံးများကို ဆားရေတွင် ငြိမ်းသတ်ရမည်။ (ပထမ
ကပင် ဆားရေ ဖျော်ထားရမည်)။ ဤနည်း အတိုင်း အကြိမ်
၁၀၀ ပြုလုပ်ပါ။

(ပထမ ဆေးဒန်းအရောင်သည် ဝါရမည်။ ဒုတိယ နိလာ
ရမည်။ တတိယ ပြန် ဝါလာရမည်။ ရှေးဦးစွာဖယောင်းကဲ့သို့
ပျော့လာသည်။)

အညွန့်။ ၊ဆန်စေ့ ကစေ့ခန့်မှ နှစ်စေ့အထိ ကွမ်းရွက်နှင့် စားခဲ့သော် အလွန် သုက်ပွားပါသည်။ ချောင်း ဆိုး ရောဂါ၊ ပန်းနာ ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင် ကိုက်ရောဂါတို့ကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းပါ သည်။

ဆေးဒန်းဆီ (၁)

မြေအိုးတလုံးတွင် ဆေးဒန်း ၁၂ ပဲသားကို ထည့်ပါ။ ထိုနောက် မရိုးစေး ၇ ကျပ် ၈ ပဲသားကို ထည့်ပါ။ အဝကို ကောင်းစွာ ပိတ်ထားပါ။ ဇော်သရွတ်မံပါ။ မြေတွင်မြှုပ်ပါ။ ၁၀ ရက် ကြာသောအခါ ထုတ်ယူပါ။ ကြိတ်နယ်ပါ။ လုံး၍ ရလောသောအခါ အလုံးကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။ အရိပ်တွင် လှန်းပါ။ စဉ့်အိုးတွင်ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ် ပံလျက် ပါတာလ ယန္တရားဖြင့်ဆီထုတ်ယူပါ။

မှားထားချက်။ ။ပါတာလ ယန္တရားဖြင့် ဆီ ထုတ် ယူပုံ ကို နောက်က ပြဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်၏။

အညွန့်။ ။မလိုဝ် သို့မဟုတ် စောပတ်ခဲတွင် သို့မဟုတ် ဗာလဝါမုန့်များ၌ အနည်းငယ်မျှ ထည့် လျက် စားပါ။ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး အား နည်း ခြင်း ကောင်း၏။

ဆေးဒန်းဆီ (၂)

ဆေးဒန်း ၁၂ ပဲ၊ ကြက်ဆူစေ့ဆန် ၁၂ စေ့၊ ဤ ၂ မျိုးကို ရော၍ ဆုံတွင်ထည့်ပြီး မရိုးစေးနှင့် ရောကြိတ်ပါ။ ဤနည်း အတိုင်း ၁၂ နာရီ အထိ ဆက်လက် ကြိတ်ပါ။ ထိုနောက် ပါတာလယ်နွှားဖြင့်ဆီထုတ်ယူပါ။

အညွှန်း။ ။ ဟတ္ထမေထုန (လက်မေထုန်) ပြုသူများ၊ မျင်းရိ သူများအတွက် အံ့ဩတွယ် ကောင်းသော ဆေး ဖြစ်၏။ ယောက်ျားလိင် ထိပ်ဖျားကို ချန်၍ လိင် ချောင်းကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ အပေါ်မှ ကြက်ဆူ ရွက်ကို စည်းပေးပါ။ ဤနည်းအတိုင်း တပတ်မျှ ပြုလုပ်ခဲ့သော် လိင်ကြောများ အားရှိလာပါလိမ့် မည်။ ဆေး ရွေးစေ့ခန့်ကိုလည်း နို့ရည်နှင့်ရော၍ သောက်ဝါက အလွန် အား ရှိ လာ ပါ လိမ့်မည်။ ထို့ပြင် နံဘေးထိုးအောင့်ခြင်း၊ နှလုံးအောင့်ခြင်း စသော ရောဂါ များ အတွက် နှမ်းဆီနှင့် ရော၍ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ အပေါ်မှ ဝါဂွမ်း ကပ်ပေးပါ။

ဆေးဒန်းဆီ (၃)


မရိုးစေးကို အဝတ်နှင့် စစ်ပါ။ ဆေးဒန်း ၁၂ ပဲသားကို ဤမရိုးစေးနှင့်အတူတကွ တနေ့လုံးကြိတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၈ ရက်ကြိတ်ပါ။ ထိုနောက် မရိုးစေး ၃ ကျပ် ၁၂ ပဲသား၊ နှမ်းဆီ

၇ ကျပ် ၈ လဲသားနှင့်ရော၍ ခြောက်သည်အထိ ကြိတ်နယ်ပါ။
 ထို့နောက် အခွံခွါပြီးသော ဗာဒိစေ့ဆန်မှုန့် ၁၀ ကျပ်သား
 နှင့်ရောပါ။ ထို့နောက် မရိုးစေး ၁၁ ကျပ်သားထည့်၍ အဆီ
 ထွက်လာသည်အထိ ကြိတ်ပါ။ ဤဆေးများကို ပါတာလ
 ယန္တရားဖြင့် ဆီထုတ်ယူပါ။

အညွှန်း။ ၊ ဤဆီလေးစက်မျှကို သကြားနှင့်ရော၍ ကျွေးပါ။
 အပေါ်မှ နွားနို့ကိုသောက်ချပါ။ ကာမသတ္တိသည်
 အလွန်တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် ကာလ
 သားရောဂါ၊ ယားယံသော ရောဂါ၊ အရေဖျား
 ရောဂါသည်တို့၌ ကောင်း၏။

ဆေးဒန်းဆတူ

ဆေးဒန်း ၁၅ ကျပ်သားကို အဝတ်နှင့် ထုပ်ပြီး နွားနို့
 ၆ ပိဿာတွင် မှန်ထုတ်ဆွဲ၍ ပြုတ်ပါ။ နို့ရေသည် ရော်ဘာ
 ကဲ့သို့ ဖြစ်လာသောအခါ ထုတ်ယူပါ။ ထို့နောက် မြေရေ
 သခေါင်း၌ထည့်ပြီး အဝကိုပိတ်လျက် မီးပေါ်တင်ပါ။ ၄ နာရီ
 အထိမီးထည့်ပါ။ အေးသောအခါ ရေသခေါင်း အဝတွင်
 ဆေးဒန်းဆတူကိုထုတ်ယူပါ။ ထို့နောက် အမြဲမပြတ် ၁၄ ရက်
 အထိ မရိုးစေးနှင့်ကြိတ်ပါ။ အပြားတခုတည်းလုပ်ပါ။ တဖန်
 ခြောက်သောအခါ ကြေးပြား ၂ခု အလည်တွင် ထား၍ သဲ
 အပြည့်ထည့်ထားသော မြေအိုးတခု၏ အလည်၌ မြှုပ်၍
 ၁၂ နာရီတိုင်တိုင် ဝါလုကယန္တရားနည်းအတိုင်း ဖုတ်ပါ။



ဝါလုကယန္တရားနည်း

ပုံပြပါအတိုင်း မြေအိုးတခုတွင် သဲအပြည့်ထားပါ။ (ပြာ၊ သို့မဟုတ် ဆားတို့ကိုလည်း စည်ပိုင်းတွင် အပြည့် ထည့်နိုင်၏။) ။ ၎င်းတို့ အလယ်တွင် ဆေးအိုး (ဆေးထည့်ထားသော ပုလင်း) ကို မြှုပ်၍မီးထည့်၍ ဖုတ်သောနည်းကိုခေါ်၏။

အညွန့်။ ။ပန်းနာရောဂါ၊ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရောဂါ နှင့် သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ၌ အလွန် ကောင်း၏။ ဆေး ရွေးစေ့ခန့်ကို ကွမ်း၊သို့မဟုတ် လေးညှင်းမှုန့်ရော၍စားပါက အလွန် ဆာလောင် လာမည်။ အလွန် အစာကြေသည်။ (ဤဆေးကို စားသူသည် တချိန်တည်းတွင် ဆန်တပြည်ချက်ကို စားသော်လည်း အစာကြေ၏)။ အလွန် လည်း သုက်ကိုပွားစေ၏။

စိန်

စိန်သည် အဆိပ်ဖြစ်သည်ကို လူတိုင်းသိကြ၏။ ထိုစိန်သည် လည်း စိန်ဖြူ၊ စိန်နီ မြင်းသွား၊ စိန်နီကြက်တူရွေး၊ စိန်ဖြူ ခိုးသံ၊ စိန်ဝါ၊ စိန်နက်၊ စိန်စိမ်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိ၏။

စိန်၏သဘာဝ

စိန်ကို အနည်းငယ်မျှသာ အဆုံး ပြု ရသည်။ အကယ်၍ အတိုင်းအတာနှင့် လျော်စွာ အဆုံး ပြု တတ် ပါက သုက်ကို ပွားစေတတ်၏။ ခွန်အားကိုဖြစ်စေတတ်၏။ အစာသစ်အိမ်ကို အားရှိစေတတ်၏။ တခြမ်းသေ လေရောဂါ၊ ခေါင်းရွဲသော လေရောဂါ စသော လေရောဂါများ၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက် ရောဂါ၊ သွေး အား နည်း ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အဖုအနာများ၊ နာတာရှည် အဖျား၊ ငှက်ဖျား စသောရောဂါများကို ကောင်းစေ၏။ သို့ရာတွင် အတိုင်းအတာ

ထက် လွန်လျှင် အလွန်အကျိုးယုတ်သည်ဖြစ်၍ အသက်ကိုပင် အန္တရာယ်ပြုတတ်၏။

စိန်ပြာ (၁)

စိန်ဖြူ (စိန်နီကိုလည်း သုံးနှိုင်းသည်) ၁၂ ဂဲသားကို လုံ့
ကောင်းကောင်းတခုတွင် ထည့်ပါ။ မရိုးစေး အနည်းငယ်စီ
အနည်းငယ်စီထည့်၍ တပေါင် ဝင်သွားသည်အထိ ကြိတ်ပါ။
အလုံးပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းတွင် ချည် ၆ ကျပ် ၈ ဂဲသားအထိ ကုန်
အောင် ရစ်ပတ်ပါ။ ၎င်းကို လုံခြုံသော အိုးတခုတွင်ထည့်ပြီး
အပေါ်မှမီးကျိုးခဲများထည့်ပါ။ အေးသောအခါ ပြေးညှင်းစွာ
ထုတ်ယူပါ။ အလွန်ဖြူသော စိန်ပြာကိုရ၏။

အညွှန်း။ ။ဆန်စေ့ တဝက်ခန့်ကို ထောပတ်ခဲသို့မဟုတ်မလိုင်
နှင့် စားပါ။ ပန်းနာချောင်းဆိုး၊ အဆစ်ရောင်ကိုက်
ရောဂါ၊ ပန်းသေရောဂါများအတွက် ကောင်း၏။

စိန်ပြာ(၂)

စိန် ၁ ကျပ် ၈ ဂဲသားကို ၄ ရက်အထိ မရိုးစေးနှင့်ကြိတ်ပါ။
အပြားလုပ်၍ နေရိပ်တွင်လှန်းပါ။ ထို့နောက် ညောင်ပြာ
၂ ပိဿာ၏အလယ်တွင်ထား၍ အိုးတလုံးတွင်ထည့်ပါ။ အိုးကို
မီးပေါ်သို့တင်လျက် ၄ နာရီအထိမီးရှို့ပါ။ အေးသောအခါ
ထုတ်ယူပါ။

အညွှန်း။ ။ဆန်စေ့ တဝက်မှ တစေ့အထိ ထောပတ်ခဲ သို့
မဟုတ် မလိုင်နှင့်သောက်ပါ။ ပန်းသေရောဂါနှင့်

အခြား သလိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ
အတွက် ကောင်း၏။

စိန်ပြာ(၃)

မရိုးစေး ၃၁ ကျပ်သားကို စဉ့်ခွက် တခုတွင် ထည့်ပါ။
သဘော်စွဲလျက်(ဂုဏ်လ)ပူပူကိုပါထည့်ပါ။ ထို့နောက် ဒုတ္တ
ပြာ ၃၀ သားထည့်ပါ။ အနည်းငယ်ကြာလျှင် မရိုးစေးသည်
ကွဲသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းကို အစတိန်နှင့်စပ်ပါ။ ၎င်းတွင် စိန်
၁၀ သားထည့်ပြီး ခြောက်သည်အထိကြိတ်ပါ။ အပြားလုပ်ပါ။
ထို့နောက် အိုးတခုခု၏အောက်ဖင်တွင် မရိုးပင်ပြာ ၃၁ ကျပ်
သားထည့်၍ အပေါ်မှစိန်ပြားကိုထည့်ပါ။ တဖန် အပေါ်မှ
မရိုးပြာ ၃၁ ကျပ်သားထပ်ထည့်ပါ။ အိုးကို ဇော်သရွတ်မံပါ။
အေး၍ လုံခြုံသောနေရာတွင် မီးသွေး ၁၀ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။
အေးသောအခါ ထုတ်ယူပါ။

အညွှန်း။ ။ဆန်စေ့ တဝက်မှ ဆန်စေ့ တစေ့ အထိ ထောပတ်
ခဲ သို့မဟုတ် မလိုင်နှင့်သောက်ပါ။ ဝါဇီကရုဏ
ဆေးလည်းဖြစ်၏။ ထောပတ်နှင့် နို့တို့ကိုလည်း
အလွန်ကြေကျက်စေတတ်၏။

စိန်ဖယောင်းဆား

(၁)မရိုး၊ (၂)ကြက်မောက်ဆူးပြန်၊ (၃)ခရမ်းကစော
၃ မျိုးတို့၏ ၆၂ ကျပ်သားစီကို ဆားချက်၍ ဆားကို ၂ဘို့
ခွဲပါ။ တတို့ကိုသံအိုးတခုတွင်ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ စိန် ၃ ကျပ်

သားကိုထည့်ပါ။ အပေါ်မှ ကျန်သောဆားကိုထည့်ပါ။ မီး
သွေးနှင့် ဥနာရီအထိချက်ပါ။ ၎င်းကို စိန်ဖယောင်းသားဟု
ခေါ်၏။

အညွန့်း။ ။ဆန်စေ့တဝက်မှ ဆန်စေ့တစေ့ အထိ တောပတ်
ခဲနှင့် ရော၍ သောက်ပါ။ နာတာရှည် ပန်းနာ
ရောဂါ၊ နာတာရှည် ချောင်းဆိုး ရောဂါတို့ကို
ဥရက်တွင် သက်သာစေ၏။ ထိုမှတစ်ပါး သလိပ်
ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၌ကောင်း၏။ ကြက်
သားဟင်း စားပါ။

ဥပရတန (ရတနာငယ်များ)

ရတနာငယ်များဟူသည် တွင်း မှ ထွက် သော ကျောက်
အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ထိုကျောက်များသည် ဓာတ်ငယ်
များကဲ့သို့ မီးတွင်းသို့ထည့်ခဲ့သော် အခိုးလည်း မထွက်တတ်၊
ဓာတ်များကဲ့သို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရှိခဲ့သော် ပွဲပြီး မလာတတ်၊
မီးပူနှင့်တွေ့ခဲ့သော် ပျော်၍ ရေကဲ့သို့ ဖြစ်မသွားတတ်ချေ။ သို့
ရာတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော် ကွဲပဲ သွားတတ်သောအရာ
ဝတ္ထုမျိုးဖြစ်၏။

ရတနာငယ်များ၏အကျိုးသတ္တိ

ဤရတနာငယ်များကို ပြာချ၍စားသောက်ခဲ့သော် အကျိုး
သတ္တိရှိရုံသာမက လည်ပင်းမှာ ဆွဲချိတ်ခြင်း၊ လက်စွပ် ကွင်း၍

ဝတ်ခါမျှနှင့် အံ့ဩတွယ် အကျိုးသတ္တိ ရှိနိုင်၏ဟု ကမ္ဘာရှိ
တိုင်းရင်းဆေးဆရာ အများစုနှင့် အနောက်တိုင်း ဆရာများ
ကပင် ယုံကြည်ကြ၏။ ဤ၌ မရိုးပင်နှင့် ပြာ ချ ချ ရ ယော
ကျောက်ငယ်မျိုးတို့ကိုသာ ငေးသားသွားမည်ဖြစ်သည်။

ကြောင်ကျောက်

ကြောင်ကျောက်သည် အလွန်ထင်ရှားသော ကျောက်
တမျိုးဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ အဖြူရောင်
စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကြ၏။ သို့ရာတွင် အနီရောင်သန်းသော
သို့မဟုတ် အဝါရောင်သန်းသော အကွက်ရှိသော ကြောင်
ကျောက်မျိုးသည် ကောင်း၏ဟု မူဆလင်တိုင်းရင်းဆရာ
များက ဆိုကြ၏။

ကျောက်၏သတ္တိများ

နှလုံးကိုအားရှိစေတတ်၏။ စိတ်ပြန်လွင့်မှုကို ကင်းဝေးစေ
တတ်၏။ ဆီးရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် လေပူကိုနိုင်၏။ သုက်ကို
ပွားစေတတ်၏။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ပဓာနအင်္ဂါရပ်များကို အကျိုး
ပြုတတ်၏။

ကြောင်ကျောက်သည် အဆွန် မာကြောသော ကျောက်
တမျိုးဖြစ်သောကြောင့် ပြာချသောအခါ သတိပြုရမည်။ သို့မှ
သာ နူးညံ့လှသောပြာကိုရနိုင်မည်။ ပြာကြမ်းဖြစ်လျှင် အကျိုး
မသက်ရောက်နိုင်သည့်အပြင် အန္တရာယ်ပြုနိုင်သည်။

ကြောင်ကျောက်ပြာ

ကြောင်ကျောက်ကို အလိုရှိသလောက်ယူ၍ မီးတွင် ထည့်ပါ။ နီမြန်းလာခဲ့သော် မရိုးစေးတွင်ငြိမ်းသတ်ပါ။ ထို့နောက် မီးတွင် နီမြန်းအောင်လုပ်ပြီး မရိုးစေးတွင် ထပ်မံငြိမ်းသတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ဆတ်သွားအောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ထို့နောက် မရိုးပွင့် ၆ ကျပ် ၁ ပဲသားကို ပျော့ဖတ်ဖြစ်အောင် ကြိတ်ပြီး ယင်း၏အတွင်းတွင်ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ အဝတ်နှင့် ဇော်မံပါ။ မီးသွေး ၁၅ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ အကယ်၍ နူးညံ့သောကြောင်ကျောက်ပြာကို အလိုရှိခဲ့သော် မရိုးစေးတွင် တနေ့ ပတ်လုံး ကြိတ်နယ်လျက် အပြားပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် အိုးတခုတွင် ထည့်ပါ။ မီးသွေး ၁၅ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။

အတိုင်းအတာ။ ။ ရွေးစေ့ဝက်ခန့်ကို နို့ရည်နှင့် တိုက်ပါ။ နှလုံးအားရှိ၏။ ပန်းနာရင်ကျပ် ပျောက်ကင်း၏။

ကံ့ကူဆန်

ကံ့ကူဆန်သည် ကျောက်တမျိုးဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ကျောက်ကဲ့သို့ မာကြောခြင်းမရှိချေ။ ၎င်းသည် (၁) ဖြူညိုရောင်၊ (၂) တောက်ပသောအဖြူရောင်ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိသည်။

ကံ့ကူဆန်ပြာ

ကံ့ကူဆန်ကို အမှုန့်ပြုလုပ်ပါ။ ခရီးရွက် သတ္တုရည်နှင့် ဝန်နီကြော ကြိတ်နယ်ပါ။ အပြားကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။

အရိပ်တွင်ခြောက်စေပါ။ အိုးတွင်ပိတ်လျက် မီးသွေး ၁ ဂရမ်သာ
နှင့် ဖုတ်ပါ။ အလိုချမ်းသောအခါ ထုတ်ယူပါ။ အမှုန်ပြုပါ။

အညွန့်း။ ။ ၁ ရွေးမှ ၂ ရွေးအထိ ထောပတ်ခဲနှင့် တိုက်ပါ။
မြင်းသရိုက်ရောင်၊ ချောင်းဆိုးရောင်၊ အဖျား
ရောင်၊ ဂနိုရောင် စသော ရောင်များ ဌ
ကောင်း၏။ အထူးအားဖြင့် ဤဆေးသည် သွေးကို
တိတ်စေတတ်သည်။

ကျောက်စိမ်း

ဤကျောက်သည် လှပ၍ လှသိများသော ကျောက်တမျိုး
ဖြစ်၏။ နှလုံးအားတိုးဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြ၏။ ယင်း
ကျောက်သည် အရောင်ကိုအစွဲပြု၍ အဖြူ၊ အနီနှင့် ရောသော
အရောင်၊ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရင့်ရောင်၊ ချိတ်ရောင်အားဖြင့်
အရောင်အမျိုးမျိုးရှိ၏။ ချိတ်ရောင်က အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။
အင်္ဂါကြီးငယ်များ အားနည်းခြင်း၊ အရူးရောင်၊ အစာသစ်
အိမ်၌ဖြစ်သော ရောင်၊ အသဏ္ဍိရောင်၊ မြွေဆိပ်သင့်သော
ရောင်များ၌ အသုံးပြုရ၏။

ကျောက်စိမ်းပြာ

ကျောက်စိမ်း ၁ ပုံသားကို မရိုးစေးနှင့် ၃ ရက် အထိ
ဆက်၍ ကြိတ်နယ်ပါ။ ထို့နောက် အလုံးကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါ။
အိုးတွင်ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး ၇ ပုံသား ၅၀ နှင့်
ဖုတ်ပါ။ ထို့နောက် တဇောင်းလက်ပတ်ရည်နှင့် ၃ ရက်ကြိတ်

ပါ။ မီးသွေး ၁၅ပိဿာ ၅၀နှင့်ဖုတ်ပါ။ အမှုန့်ပြု၍ ပုလင်း
တွင် ထည့်ထားပါ။

အညွှန်း။ ။ရွေးစေ ခန့်ကို ဆီးဖျော်ရည်နှင့်တိုက်ပါ။ အသည်း
အားနည်းခြင်း၊ နှလုံးတုန်ရင်ခုံခြင်း၊ အရူးရောဂါ
စသည်တို့ ပျောက်ကင်း၏။ နှလုံး အလွန် အား
ကောင်း၏။

နှားသွားကျောက်

နှားသွားကျောက်သည် ကျောက်တမျိုးဖြစ်၏။ မျက်စင်းညှို့
ကျောက်နှင့်တူ၏။ သို့ရာတွင် မျက်စင်းညှို့ကျောက်လောက်
မမာကြောချေ။ အနည်းငယ်ထိခိုက်မိရုံမျှနှင့် ကွဲ သွား တတ်
သည်။ ၎င်းသည် အမျိုးမျိုးရှိသည်။

နှားသွားကျောက်ပြာ(၁)

နှားသွားကျောက် ၃ကျပ် ၁၂ပဲသားကို အမှုန့် ပြုပါ။
ထို့နောက် အိုးတခုတွင်ထည့်ပြီး မရိုးစေး ၇ကျပ် ၈ပဲသား
လောင်းထည့်ပါ။ အိုးကိုဖော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး ၇ပိဿာ
၅၀ နှင့် ဖုတ်ပါ။ ပြာရ၏။

အညွှန်း။ ။ရွေးစေ ၂စေ့ ခန့်ကို ကြိုက်ရာရှာလာတတ်ရည်နှင့်
သောက်ပါ။ အဖျားအမျိုးမျိုး ပျောက်ကင်း၏။
အထူးအားဖြင့် အ ဆုတ် ရောဂါ ၌ ကောင်း၏။
ချောင်းဆိုး ရောဂါ၌ အထူးကောင်း၏။

နွားသွားကျောက်ပြာ(၂)

နွားသွားကျောက် ၃ ကျပ်သားကို အိုးတခုတွင် ထည့်ပါ။
နွားသွားကျောက် မြှုပ်သွားသည်အထိ မရိုးစေးကို ထည့်ပါ။
ထို့နောက် အိုးကိုဇော်သရွတ်ပုံပါ။ အခြောက်လှန်းပါ။ မီး
သွေး ၁၅ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ ပြာဖြူရ၏။

အညွှန်း။ ။အဆစ်ရောင်ကိုက် ရောဂါရှိသူကို ရွေးစေ ၂စေ၊
ခန့်ကို မလိုင်နှင့်တိုက်ပါ။

နွားသွားကျောက်ပြာ ရွေးစေ ၂စေ၊ စမုန်ဖြူ
မှုန့်ဖိပဲသား၊ ဆားတပဲသားနှင့် ရော၍တိုက်ပါက
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ဖြစ်သော ဝမ်း
ဗိုက်အောင့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

နွားနို့တပေါင်ကို ရေနွေးတပေါင်နှင့်စပ်ပါ။
ယင်းတွင် နွားသွား ကျောက်ပြာတရွေးထည့်ပါ။
၎င်းကိုတိုက်ပါ။ ချွေးမထွက်သောမည်သည့်အဖျား
အမျိုးမျိုးမဆို ချွေးထွက်၍ အဖျား ကျသွားပါ
လိမ့်မည်။

နွားသွားကျောက်ပြာ ရွေးစေ ခန့်ကို ည အိပ်
သောအချိန်တွင် ကွမ်းရွက်နှင့်ထုပ်ပြီးစားပါ။ခက်ခဲ
လှသော ချောင်းဆိုးရောဂါပင် ပျောက်ကင်း၏။

လချေး

လချေးသည် (၁)အဖြူ (၂)အနက်ဟူ၍ ၂မျိုးရှိသည်။
အဝါမျိုးရှိသေး၏ဟုဆိုကြသေး၏။လချေးကို ပြာမချမီကြိုတင်
၍ အမှုန့်ပြုရသည်။၎င်းကို သုဒ္ဓ ပြုလုပ်နည်းဟု ခေါ်သည်။

သုခပြုလုပ်ပုံ

လချေးကို ဆုံစသည်တို့နှင့်ထောင်း၍ အမှုန့်ပြုပါ။ (စက်နှင့်လည်း ကြိတ်လို့ရသည်) ပိတ်အိတ်ထူထူတခုတွင် ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ထိုပိတ်အိတ်တွင် ကျောက်ခဲအတုံးအစကလေးများကို ထည့်ပါ။ ထို့နောက် အိတ်ဝကိုပိတ်ပါ။ ထိုနောက် ခွက်ကြီးကြီးတခုတွင် ရေနွေးထည့်ပြီး အထက်ပါပိတ်အိတ်ကို ထိုရေနွေးခွက်တွင်ထည့်ပါ။ လက်နှင့်နာနာပွတ်နယ်ပါ။ လချေးမှုန့်များသည် အိတ်မှ ရေနွေးတွင်းသို့ ကျပါလိမ့်မည်။ အနည်းငယ် ကြာသောအခါ ရေကိုငဲ့၍ သွန်ပစ်ပါ။ လချေးသည် အောက်တွင် ထိုင်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းလချေးမှုန့်ကိုသာ ပြာချရမည်။

လချေးပြာ၏အကျဉ်းချုပ်အကျိုးသွား

လချေးပြာကို ရောဂါအမျိုးမျိုး၌ သုံးရသည်။ အထူးအားဖြင့် ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ ပိတ်ဝမ်း၊ ဝမ်းကိုက်၊ ပန်းသေ၊ အကြောကြီးများအားနည်း၊ နာတ်အားနည်း၊ သုက်အားနည်း၊ လေပူရောဂါ၊ ဆီးရောဂါ စသည်တို့၌ ကောင်း၏။ ထို့ပြင် အဖျားရောဂါအမျိုးမျိုး၊ အပူကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၌ ကောင်း၏။

လချေးပြာ (၁)

လချေးနုတ် ၃ ကျပ် ၁၂ ပဲကို ၃ရက်တိုင် မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်နယ်ပါ။ အလုံးပြုပါ။ မြေအိုးတခုတွင် ဇော်သရွတ်မံ၍ မီးထွေး ၇ ပိဿာ ၅၈ ကျပ်ထားနှင့်ပုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း

မရိုးစေးနှင့် တရက် ကြိတ်နယ်၍ အလုံးပြုလုပ်ပြီး ရှေ့နည်း အတိုင်း ထုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း အကြိမ် ၂၀ ပြုလုပ်ပါ။ အနီရောင် လချေးပြာကိုရလိမ့်မည်။ ဤပြာသည် အပူကြောင့် ဖြစ်သော အဖျားကိုသာမဟုတ်၊ သလိပ် ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၌လည်း ကောင်း၏။ (သလိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၌ ဂျင်းစိမ်းရေနှင့်တိုက်ပါ)။

အညွန့်။ ။ အစာမကြေရောဂါ၌ စမုန်စပါးပေါင်းတိုက်ရေ နှင့်တိုက်ပါ။ ချောင်းဆိုး ရောဂါ၌ ခရမ်းကစော့ သတ္တုရေနှင့်တိုက်ပါ။ အဖျားရောဂါ၌ နွားနို့နှင့် တိုက်ပါ။ နာတာရှည်အဖျားရောဂါ၌ ကွမ်းရွက် ပြုတ်ရေနှင့် တိုက်ပါ။ သက်အားနည်း ရောဂါ၌ ကြက်ဥဟတ်ထွိုင်း (ဆို့မဟုတ်) ထောပတ်ခဲနှင့် တိုက်ပါ။

လချေးပြာ (၂)

သုဒ္ဓ ပြုထားသော လချေး အဖြူမှုန့် ၁၂ ဖဲသားကို အလယ်တွင်ထားပြီး မရိုးစေး ၃ ကျပ်၊ ယမ်းစိမ်း ၆ ပဲတို့နှင့် အထက်အောက်ထားလျက် မြေအိုးတွင်ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ် မံပါ။ မီးသွေး ၇ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ ပြာကို ရပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မီးတိုသတိမထားမိ၍ အရောင်အဆင်း မတောက် သေးလျှင် မရိုးစေးနှင့် တရက်ကြိတ်နယ်ပါ။ အလုံး လုံးပါ။ လုံတခုတွင်ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ် မံပါ။ မီးသွေး ၅ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ အကောင်းဆုံးပြာကို ရပါလိမ့်မည်။

အညွန့်၊ ။ရွေးစေ့ ခန့်ကိုသကြား(သို့မဟုတ်)ရှာလပတ်ရည်
တခုနှင့်ရောပြီးတိုက်ပါ။ နာတာရှည် အဖျားရော
ဂါ၊ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။အဆုတ်နာ
ကိုရွေးစေ့ ခန့်စား၍ဒိန်ချဉ်တဖလ်ခွက်သောက်ပါ။

လချေးပြာ (၃)

လချေးနက်ကို နောက်ကပြဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း သုခပြုပါ။
မရိုးစေးနှင့် ၁၂ နာရီအထိ ကြိတ်နယ်ပါ။ အပြားကလေးများ
ပြုလုပ်ပါ။ မြေအိုးတခုတွင် မရိုးရွက်များကို ခင်း၍ ထိုအပြား
ကလေးများကို ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ် မံပါ။ အခြောက်ခံပါ။
မီးသွေး ၂ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၆ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။
ထို့နောက် ညောင် မုတ် ဆိတ် မြစ်နု များ ၏ သတ္တုရေနှင့်
ကြိတ်နယ်၍ ၇ ကြိမ်ဖုတ်ပါ။ ဖုတ်သောအကြိမ်တိုင်း မီးသွေးကို
နောက်ဆုံး ၃ ပေါင် အထိ ကျန်အောင် လျှော့၍ လျှော့၍
ထည့်ပါ။ အားလုံး ၁၄ ကြိမ်ရလျှင် ပြာကျ၏။ ထို့နောက်
၎င်းဆေးနှင့် ဆတူ နွားထောပတ် ထည့်ပြီး သံဒယ်အိုးနှင့်
ထောပတ်ခြောက်သည်အထိချက်ပါ။ အမှုန့်ပြုပြီး သိမ်းထားပါ။
အညွန့်၊ ။ဆန်စေ့ တစေ့ ခန့်ကိုမလိုင်(သို့မဟုတ်)ထောပတ်
ခဲနှင့်တိုက်ပါ။ သုက်ကိုအလွန်ပွားစေ၏။ နို့ ရည်ကို
ပွားစေ၏။ ရသာယာနု ဆရာတို့ကမူ ဤပြာသည်
ပြဒါးပြာနှင့် တူသော သတ္တိရှိ၏ဟု ဆိုကြ၏။

သမုဒ္ဒရာထွက် ဆေးပစ္စည်းများကို ပြာချပုံ

သမုဒ္ဒရာနှင့် မြစ်ချောင်းတို့မှလည်း ဆေးပစ္စည်းများသည်

အများအပြားထွက်ကုန်၏။ ထိုဆေးပစ္စည်းတို့သည်လည်း ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ကုန်၏။ ၎င်းတို့မှာ ခရုသင်း၊ ကြွေပုတ်၊ သန္တာ၊ ပုလဲ စသည်တို့ဖြစ်ကုန်၏။

သမုဒ္ဒရာထွက်ဆေးပစ္စည်းများ၏ ထူးခြားသောစွမ်းအင်များ

သမုဒ္ဒရာထွက်ဆေးပစ္စည်းများသည် ပုလဲစသော ပြာမချပဲ အသုံးပြုရသော ဆေးမျိုး၊ ပြာချပြီးမှသော်၎င်း၊ ပြားမချပဲသော် ၎င်းအသုံးပြုရသောခရုသင်း၊ ကြွေ၊ ကြွေပုတ်စသောဆေးပစ္စည်း မျိုးဟူ၍ ၂ မျိုးရှိကုန်၏။ အချို့သောသမုဒ္ဒရာထွက်ဆေးပစ္စည်း များ၏ ပြာများသည် ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးနီ၊ သံ၊ ဘင်၊ ခဲစသော ဓာတ် ပစ္စည်းများ၏ ပြာများ၊ ပြဒါး၊ ဟင်းရိုင်း၊ ဆေးဒန်း စသော ပြာများနှင့်စာလျှင် လူတိုင်း လွယ်ကူစွာ ပြာချနိုင်ခြင်း၊ အန္တ ရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပိုမိုကောင်းသည်။

ကြွေ

ကြွေသည် ပုံပန်းသဏ္ဌာန် အရောင်အဆင်း စသည်တို့ကို အစွဲပြု၍ အမျိုးအစားမြောက်မြားစွာရှိသည်။

ကြွေပြာ

ကြွေများကို အလိုရှိသရွေ့ ယူ၍ အိုးတလုံးတွင် ထည့်ပါ။ မရိုးစေးကို မြုပ်အောင်ထည့်ပါ။ အိုးကို ဇော်သ ရွတ်ပံပါ။ မီးသွေး ၁၀ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ မွှကြွ နေသော ပြာဖြူကို ရပါလိမ့်မည်။ အမှုန်ပြု၍ ကောင်းစွာ သိမ်းထားပါ။

အညွန့်။ ။ တရွေး မှ နှစ်ရွေး အထိ မလိုင် (သို့မဟုတ်) ထောပတ်ခဲနှင့်တိုက်ပါ။ ဂနို ရောဂါ၊ ဆီးရောဂါ အမျိုးမျိုး၊ အိပ်မက် သုက်လွှတ်ရောဂါ၊ ဝမ်းသက် ရောဂါ၊ ပိတ် ဝမ်း ရောဂါ၊ မီးယပ်ဖြူ ရောဂါ စသည်တို့၌ကောင်း၏။ နားကိုက်လျှင် နားတွင်းသို့ ထည့်၍ အပေါ်မှ သံပုရာရေညှစ်ထည့်ပါ။ (နား ကိုက်ခြင်း၊ ချက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏)။

ခရသင်း

ခရသင်းသည် အကြီးအသေး စသော ပုံသဏ္ဌာန်ကို စွဲ၍ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိ၏။ အယ်ဆုံးသည် ရွေးစေ့ခန့်၊ အကြီးဆုံး ၂ ပီဿာ ၅၀ ခန့်ရှိတတ်၏။ ခရသင်းကြီးမျိုးတို့ကို ပုဏ္ဏားတို့သည် တံသိက်ပွဲစသည်တို့၌ အသုံးချတတ်ကြ၏။

ခရသင်းပြာအကျိုးသွားများ

ခရသင်းပြာသည် အပူကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၌ လည်းကောင်း၊ အအေးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၌လည်း ကောင်း အသုံးပြုနိုင်၏။ အထူးအားဖြင့် အဖျားအမျိုးမျိုး၊ မြွေဆိပ်၊ ခွေးရူးဆိပ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ဓာတ်အား ကုန်ခမ်းခြင်း၊ အိပ်မက်သုက်လွှတ်ရောဂါ၊ မီးယပ်ဖြူ၊ မြင်းသရိုက် ရောဂါ၊ အကြောတွင်ဖြစ်တတ်သော ပြည်တည်နာ၊ ဘရင်ဂျီနာ၊ ဝမ်းသက်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ဂနိုရောဂါ၊ ယားယံနာစသည် တို့၌ ကောင်း၏။

အဖျားရောဂါအမျိုးမျိုး၌မူ ချွေးထွက်ပြီး အဖျားသည် လျင်မြန်စွာကျသွား၏။ သို့ရာတွင် ဤဆေးသောက်ခြင်းကြောင့် နှလုံးအားနည်းသွားခြင်း မရှိချေ။

ခရုသင်းပြာ(၁)

မရိုးစေးတွင် ဆားကို အမှုန့်ပြုပြီး အနည်းငယ်ရောလျက် မြေအိုးတခုတွင်ထည့်ပါ။ ၎င်းတွင် ခရုသင်းကို ထုထောင်း လျက် ထည့်ပါ။ မရိုးစေးသည် ခရုသင်းကို မြုပ်နေစေရမည်။ ထို့နောက် ဇော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး ၁၅ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါထုတ်ယူပါ။ အရောင်လက်နေသော ခရုသင်း ပြာကို ရမည်။ ၎င်းကို အမှုန့်ပြု၍ ဖလ်ဗူးတွင်သိမ်းပါ။

အညွှန်း။ ။ ခဲသားခန့်ကို တနေ့ ၃ ကြိမ် ဆူးပဒေါင်းရွက် ပြုတ်ရည်နှင့်တိုက်ပါ။ ဆေးသောက်သော အချိန် တွင် နံပြား၊ ပေါင်မုန့်စသော လျှံနှင့်ပြုလုပ်သော မုန့်နှင့် ကြက်သား ပြုတ် ရည် ကိုသာ စားပါ။ ကျောက်သည် ကွဲ၍ကျပါလိမ့်မည်။

ခရုသင်းပြာ(၂)

ခရုသင်းကို ဆုံတွင်ထောင်း၍ အမှုန့်ပြုလုပ်ပါ။ မြေအိုး တလုံးတွင်ထည့်ပြီး မရိုးစေးကိုမြုပ်အောင်ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ် မံပါ။ မီးသွေး ၁၅ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါထုတ်ယူပါ။ ပြောင်လက်နေသော ခရုသင်းပြာဖြူကိုရပါလိမ့်မည်။ အမှုန့်ပြု သိမ်းထားပါ။

အညွှန်း။ ။ ၁ ရွေးမှ ၂ ရွေးအထိ သင့်သောရေလဲနှင့်တိုက်ပါ။

ဥပမာ အဖျားကို စမုန်စပါးပေါင်းတိုက်ရည်(သို့မဟုတ်) နွားနို့ ပူပူနှင့်တိုက်ပါ။ ဝမ်းသက်ရောဂါကို ဆန်ဆေးရည်နှင့်တိုက်ပါ။ ဆီးရောဂါကို ထောပတ်ခဲနှင့်တိုက်ပါ။ မြွေကိုက်သူကိုထောပတ်နှင့်တိုက်ပါ။

ခရုသင်းပြာ(၃)

ခရုသင်း ၃ ကျပ်သားကို ထုထောင်းအမှုန့်ပြုလုပ်ပါ။ နို့ ရည်နှင့် တနေ့လုံးကြိတ်နယ်ပါ။ ထို့နောက် အိုးတလုံးတွင်ထည့်ပြီး အပေါ်မှ မရိုးစေးကို မြုပ်အောင်ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး ၅ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ ထုတ်ယူပြီး မရိုးစေးနှင့် တနေ့လုံးကြိတ်နယ်ပါ။ အလုံးကလေးပြုလုပ်ပါ။ အခြောက်ခံပါ။ ခြောက်သောအခါ မြွေပါအသေကောင်၏ ဗိုက်ကို ခွဲ၍ထည့်ပါ။ ထို့နောက် မြေအိုး ကြီးကြီးတခုတွင် ထည့်ပြီး ဇော်သရွတ်ပါ။ ထို့နောက် အားလုံး ပြာကျသည်အထိမီးဖုတ်ပါ။ ပြာကျသောအခါ မြွေပါနှင့်တကွ အားလုံးကို အမှုန့်ပြု၍သိမ်းပါ။

အညွှန်း။ ။ရွေးစေ့ခန့်ကို သကြား ၁၂ ပဲသားနှင့် ရော၍ ကျွေးပါ။ ၃ နာရီ တကြိမ်၊ ၃ နာရီ တကြိမ် ကျွေးပါကမြွေဆိပ်ကိုအလွန်နိုင်၏။

သန္တာ

သန္တာကို အချို့သူတို့က ရေ၏ အတွင်းတွင် နေသော ပိုးကောင်တမျိုးဟု ယူဆကြ၏။ အချို့က ရေအတွင်းတွင် သစ်ပင်တမျိုးသည်ရှိ၏။ ထို့အပင်၏ အကိုင်းအခက်ဟု ဆိုကြ၏။

သန္တာ၏အကျိုးသွား

သန္တာပြာကိုလည်း ခရုသင်းပြာကဲ့သို့ ရောဂါ အမျိုးမျိုး တို့၌ အသုံးပြုရ၏။ ဥပမာ မျက်စိရောဂါ၊ ယားယံနာ၊ ရူးသွပ် သောရောဂါ၊ ရေငတ်ရောဂါ၊ ပိတ်ဝမ်းရောဂါ၊ ချောင်းဆိုး ရောဂါ၊ ဆီးရောဂါ၊ အဖျဉ်းရောဂါ၊ မီးယပ်ဖြူ ရောဂါ၊ မီးယပ် သွေးလွန်နာ၊ အဖျားရောဂါ၊ နာကျင် ကိုက်ခဲသော ရောဂါ စသည်တို့ဖြစ်ကုန်၏။

အကိုင်းအခက်သန္တာပြာ

အကိုင်းအခက်သန္တာ ၁၂ ပဲသားကို စဉ့်ပန်းကန်လုံး တခု တွင် ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ မရိုးစေးကို မြှုပ်အောင်ထည့်ပါ။ ၎င်းကို တနေ့နှင့် တည စိမ်ထားပါ။ ထို့နောက် မရိုးစေးမှ ထုတ်ယူပါ။ မြေအိုးတလုံးတွင်ထည့်ပါ။ အန္တာပိတ်ပါ။ မီးသွေး ၁၅ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ ပြာဖြူကို ရပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပြာဖြူကို မရပါက ယခင်နည်းအတိုင်း ထပ်လုပ်ပါ။ အမှုန့် ပြုပါ။ ဖလ်ပုလင်းတခုတွင် ထည့်ထားပါ။

အညွန့်။ ရွေးစေ ခန့်ကို ထောပတ်ခဲစသည်တို့နှင့်တိုက်ပါ။ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက် ရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ နှလုံးတုန် ရင်ခုန်ခြင်းစသည်တို့၌ ကောင်း၏။

သန္တာကောင်ပြာ

သန္တာကောင် ၃ကျပ်၊ မရိုးစေး ၂၅ ကျပ်၊ ၂မျိုးကိုမြေအိုး တခုတွင် ထည့်ပါ။ အဝကိုဂျုံနှင့်ပိတ်ပါ။ မီးသွေး ၃၀ ပိဿာ

နှင့်ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ ထုတ်ယူပါ။ သန္တာကောင်ပြာကို သီးသန့်ထားပါ။ မရိုးစေးပြာကို သီးသန့်ထားပါ။ ၂ မျိုးစလုံး အသုံးဝင်သည်။

အညွှန်း။ ။မရိုးစေးပြာကို ဆန် ၂ စေခန့်မှဆန် ၄ စေ ခန့်အထိ ကွမ်းရွက်နှင့်တိုက်ပါ။ တက်ဖျား ကျဖျား၌ အဖျား မတက်မီ ၁ နာရီအတွင်း၌ ၂ ကြိမ်နွားနို့ နှင့်တိုက် ပါ။ သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါတို့၌သုံးပါ။ သန္တာကောင် ပြာကို ရွေးစေ့ဝက်မှ တရွေး အထိ တိုက်ပါ။ ပန်းနာ ရောဂါ၌ ကောင်းသည်။ ဆေးတိုက်စဉ်အတွင်း ပဲစဉ်းငုံကိုသာ ကျွေးပါ။ အခြား မည်သည့်အစာကိုမျှ မကျွေးရ။

ယောက်သွား

ယောက်သွားသည် အရောင်အဆင်းနှင့် အကြီးအသေးကို အစွဲပြု၍ အမျိုးမျိုးရှိ၏။ သို့ရာတွင် ဗုလဲထွက်သော ယောက် သွားသည် ကောင်း၏။

ယောက်သွား၏အကျိုးသွား

အဖျားအမျိုးမျိုး၌ကောင်း၏။ ထို့ပြင် ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ပန်းနာရောဂါ။ အဖျဉ်းရောဂါ။ ဓာတ်အား ကုန်ခမ်းသော ရောဂါ။ နှလုံးအားနည်းခြင်း။ နံဘေး အောင့်သော ရောဂါ တို့၌ကောင်း၏။

ယောက်သွား အသေးမျိုးပြာ(၁)

ဗုလဲထွက်သော ယောက်သွားအသေးမျိုးကို အလုံရှိသရွေ့

ယူ၍ မြေအိုးတခုတွင် ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ လက်နှစ်သစ် မြုပ်
အောင် မရိုးစေးကိုထည့်ပါ။ အိုးကို ဇော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး
၁၀ ပိဿာ (သို့မဟုတ်) ၁၅ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ အားလုံး
အရောင်လက်၍ ပြာကျသွားမည်။

အညွန့်။ ။ ရွေး၄စေ့ခန့်ကို ကြက်ဥ၏အလယ်တွင် ထားပြီး
စားပါ။ အပေါ်မှ စမုန်စပါးပေါင်းတိုက် ရည်ပူပူ
ဥကျပ်သားကို သောက်ပါ။ နံတေး အောင့်သော
ရောဂါ၌ အထူးကောင်း၏။ ထိုမှတပါး ချောင်းဆိုး
ရောဂါ၊ ပန်းနာရောဂါ စသည်တို့၌ ကွမ်းရွက်
ပြုတ်ရေနှင့် သောက်ပါ။ ချောင်းခြောက် ဆိုး
ရောဂါ၌ ထောပတ်ခဲနှင့် သောက်ပါ။

ယောက်သွားပြာ (၂)

ယောက်သွား(အကြီးမျိုး)ကို အလိမ္မော်သရွေ့ ယူပါ။ အပေါ်မှ
မရိုးစေးကို မြုပ်အောင် ထည့်ထားပါ။ မရိုးစေးခြောက်သွား
သောအခါ မြေအိုးတလုံးတွင်ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ ဇော်သရွတ်
မံပါ။ မီးသွေး ၁၀ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ ထုတ်
ယူပါ။ အမှုန့်ပြုပါ။ ဖလံဗူးတွင်ထည့်ထားပါ။

အညွန့်။ ။ ၃ ရွေးခန့်ကို ထောပတ်ခဲ(သို့မဟုတ်)မလိုင်နှင့်
စားပါ။ အစာကိုကြစေတတ်၏။ သုက်ကိုပွားစေ
တတ်၏။ ဓာတ်အား တုန်ခမ်းသော ရောဂါတို့၌
အလွန်ကောင်း၏။

ယောက်သွားပြာ(၃)

ပုလဲထွက်သော ယောက်သွားကိုမြေအိုးတခုတွင် ထည့်ပါ။
မရိုးစေးကို မြုပ်အောင်ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ်မံပါ။ မီးသွေး
၁၅ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ ဖြူသောပြာကို ရမည်။

အညွန့်။ ။ ၂ရွေးခန့်ကိုထောပတ်ခဲ၊ မလိုင်၊ နွားနို့၊ တခုခုနှင့်
သောက်။ နှလုံးရောဂါ၌ကောင်း၏။ အစာသစ်အိမ်
ကို အားရှိစေ၏။ ချောင်းဆိုးရောဂါ၌အကျိုးပြု၏။

ယောက်သွားပြာ(၄)

ပုလဲထွက်သော ယောက်သွားကို အလိုရှိသရွေ့ ယူပါ။
တပတ်အထိ မရိုးစေးတွင်စိပ်ပါ။ ဓားစသည်ဖြင့် အပေါ်မှအမဲ
ရောင်များကို ခြစ်ပစ်ပါ။ အဖြုန်းပြုလုပ်၍ ဆုံတွင် ထည့်ပါ။
တနေ့လုံး မရိုးစေးနှင့် ကြိတ် နယ် ပါ။ အလုံး က လေး များ
ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် လုံကြီးကြီး (သို့မဟုတ်) မြေအိုးတွင်
ထည့်ပါ။ မီးသွေး ၂ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၃ နာရီ
မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်နယ်၍ မီးသွေး ၂ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။

အညွန့်။ ။ ၂ရွေးခန့်ကို မလိုင် (သို့မဟုတ်) ထောပတ်ခဲနှင့်
စားပါ။ သွက်ကိုပွားစေ၏။ ဆီးရောဂါအမျိုးမျိုးတို့၌
ကောင်း၏။

ပြာအမျိုးမျိုး

ဒုတ္တာ

ဒုတ္တာသည် ဥမုဇာတု(နတ်ငယ်)မျိုးဖြစ်၏။ ကြေးနီမှရ၏။
ဓာတ်ဆရာများသည် ဒုတ္တာမှတဆင့် ကြေးနီကို ထုတ်ယူကြ၏။

(၎င်းသည်စင်ကြယ်၍ အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။) ဒုတ္တာသည် လေထိလျှင် မကောင်း ဖြစ် သွားတတ် ၏။ ၎င်းသည် အညိုမျိုး၊ အစိမ်းမျိုး ဟူ၍ ၂ မျိုး ရှိ၏။

ဒုတ္တာ၏အကျိုးသွားများ

များများ စားလျှင် အန်တတ်၏။ ကြက်ညှာ ချောင်းဆိုးကောင်း၏။ ကံလသားရောဂါ၌ကောင်း၏။ အကြိတ်အဖုတို့၌ကောင်း၏။

ဒုတ္တာပြာဖြူ

ကုလားကင်ပွန်းချဉ်ခေါက် တပေါင်ကိုအမှုန့်ပြု၍ မရိုးစေး ၁၀ ကျပ်သားနှင့် ကြိတ်နယ်ပါ။ အလုံး ၂ လုံး လုံးပါ။ ၎င်း ၂ ခုတို့၏ အလယ်တွင် ဒုတ္တာ ၁၂ ပဲသား ထည့်ပါ။ ထိုအလုံး ၂ လုံးကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဟပ်ထားပါ။ မြေအိုး တလုံးတွင် ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ်မံပါ။ လေမတိုက်သောနေရာ၌ တွင်းတူးလျက် မီးသွေး၃ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ ထုတ်ယူပါ။ ပြာအနည်းငယ်ကို ဖိန်ချဉ်တွင်ထည့်ပြီးကြည့်ပါ။ ဒုတ္တာရောင်မရှိလျှင် အောင် မြင် ၏။ အကယ်၍ ဒုတ္တာ ရောင် ပြန်ဖြစ်လျှင် မရိုးစေးနှင့် ၂ နာရီကြိတ်နယ်ပါ။ ယခင်နည်းအတိုင်း ပြန်ဖုတ်ပါ။

အညွန့်း ၊ ဆန်စေ့တစေ့မှ ၄ စေ့အထိ မလိုင်နှင့်တိုက်ပါ နာတာရှည် လေလုံးရောဂါ၊ ယားယံသောအနာပွေးနာ၊ ကာလသားရောဂါစသည်တို့၌ကောင်း၏။ ဆေးသောက်သောအခါ ထောပတ်ထမင်းစားပါ။

ဒုတ္တာပြာစိမ်း

ဘွင်းထွက် ဒုတ္တာစိမ်း ၁ ကျပ် ၈ ပဲသားကို အမှုန့်ပြုပါ။
တနာရီ အထိ မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်နယ်ပါ။ အခြောက်လှန်း။
နောက်ထပ် တနာရီ မရိုးစေးနှင့်ကြိတ်ပါ။ အခြောက်လှန်းပါ။
ဤနည်းအတိုင်း ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် နွားထောပတ်
နှင့် နယ်၍ ဖယောင်းချက် ပမာ ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်
ဝါဂွမ်းကို ၎င်းနှင့်ရောလျက် မီးဇာသဖွယ်ပြုလုပ်ပါ။ မီးခွက်
တွင်တပ်၍မီးထွန်းပါ။ မီးခွက်အပေါ်တွင် မြေပန်းကန်ပြားကို
ဆွဲထားပါ။ ထိုမြေပန်းကန်ပြားတွင် ကြပ်ခိုးများစုနေလိမ့်မည်။
ထို့နောက် ကြပ်ခိုးများနှင့် မီးလောင်ကျွမ်းထားသောမီးဇာကို
ရောထားပါ။

အညွန့်။ ။ဤဆေးကို ရွေးစေ့ တဝက်မှ တရွေးအထိ အပြင်
တိမ်ကို မျက်စဉ်းတံဖြင့် မျက်စဉ်းခတ်ပါ။ အပေါ်
မှ ကြက်ဆူရွက်ကိုစည်းပါ။ ဥနာရီကြာလျှင် ခွာ၍
နောက်ထပ်ဆေးထည့်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း တနေ့
၅ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ ကြက်ဆူရွက်ကို မရနိုင်ခဲ့
သော် ကွမ်းရွက်နှင့်စည်းပါ။ တနေ့တည်းတွင်ပျောက်
၏။ (ခွဲစိတ်ကုသသကဲ့သို့ပင် ချက်ခြင်းမျက်စိမြင်၏။)

ဣန္ဒနံကျောက်

ဤကျောက်သည် ဥပဓာတ် (ဓာတ်ဝယ်) မျိုးဖြစ်၏။ လေးလံ
၍ အဝါရောင်သန်း၏။

ဣန္ဒနံကျောက်အကျိုးသွား

အအေးနှင့်သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၌ကောင်း၏။ အထူးအားဖြင့် ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာကောင်း၏။ ဝမ်းပိုက်ရှိ ပိုးများကျ၏။

ဣန္ဒနံကျောက်ပြာ(၁)

ဣန္ဒနံကျောက်ပြာ ၁ ပွဲသားကို အပိုင်းအစကလေးများပြုလုပ်ပါ။ မြေအိုးတလုံးတွင်ထည့်ပြီး မရိုးစေ့ကိုမြုပ်အောင်ထည့်ပါ။ ၂၄ နာရီကြာလျှင် ဇော်သရွတ်မံပြီး အခြောက်ခံပါ။ မီးသွေး ၁ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ အေးသောအခါ အမှုန့်ပြုပြီးပါ။

အညွှန်း။ ။ တရွေးခန့်ကို ထောပတ်ခဲအလယ်တွင် ထည့်ပြီး စားပါ။ သို့မဟုတ် ကြက်ဥအလယ်တွင် ထည့်ပြီး စားပါ။ လေဗူထသောရောဂါ၊ ကာလသား ရောဂါ၊ ဝမ်းတွင်းပိုးရှိသောရောဂါများ၌ ကောင်း၏။ မြွေကိုက်လျှင် မျက်စဉ်းခတ်ပါ။ အဆိပ်ကျ၏။

ဣန္ဒနံကျောက်ပြာ(၂)

ကြက်သွန်ဖြူ ၃ ကျပ် ၁ ပွဲသားကို မရိုးစေ့နှင့်ကြိတ်နယ်ပါ။ အတွင်းတွင် ဣန္ဒနံကျောက်ထည့်ပြီး ပိတ်ပါ။ မီးသွေး ၁ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ ဤအတိုင်း ၇ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။

အညွှန်း။ ။ ရွေးစေ့ ဝက်ခန့် အသုံးပြုပါက မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ ဝမ်းတွင်းပိုးရောဂါတို့၌ ကောင်း၏။

ဗဟန်းရွှေ

ဗဟန်းရွှေသည် ဥပဓာတ်(ဓာတ်ငယ်)မျိုးဖြစ်၏။ အရောင်သည် ရွှေရောင်နှင့်တူ၏။

ဗဟန်းရွှေ၏အကျိုးသွား

ယူနာနီနှင့် တိဗက်တို့တွင် မျက်စိရောဂါတို့၌အသုံးပြုကြ၏။ ၎င်းပြင် ၎င်းပြာသည် ဆီးရောဂါအမျိုးမျိုး၊ အိပ်မက်သုက်လွှတ်ရောဂါ၊ သုက်မြန်ရောဂါ၊ ဓာတ်များယိုစီးကျသောရောဂါတို့၌ ကောင်း၏။ သုက်ဓာတ်ကို ပြစ်ခဲ စေတတ်၏။ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာတို့၌အကျိုးပြု၏။ အင်္ဂါကြီးငယ်များစောင်းရွဲ့သော ရောဂါ၊ တုန်လှုပ်သော လေရောဂါတို့၌ကောင်း၏။

ဗဟန်းရွှေပြာ(၁)

ဗဟန်းရွှေ ၁ကျပ် ၄ပဲ၊ ပြဒါး ၁ကျပ် ၄ပဲ ဤ ၂မျိုးတို့ကို ၄နာရီအထိ မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်နယ်ပါ။ အလုံး ပြုလုပ်ပါ။ ခြောက်သောအခါ အမှုန့် ပြုထားသော သနပ်ထော်စေး ၁ကျပ် ဂဲပဲသားကို အထက်အောက်မှိပ်ပါ။ ထိုနောက် မီးသွေး ၂ပိဿာတွင်ထည့်ပါ။ မီးသွေးအပေါ်မှ ဇော်သရွတ် မံပါ။ မြေပူတွင် (မီးနှင့်မြှိုက်ထားသောမြေ) ၄နာရီအထိ ထားပါ။ ထို့နောက် ထုတ်ယူပါ။ ဤဓာတ်ဆေးလုံးသည် အပေါ်မှဖြူ၍ အတွင်းတွင် မဲနေလိမ့်မည်။

အညွှန်း။ ။ဆန်တစေ့ ခန့်မှ ၂မစ ခန့်အထိ ထောပတ်ခဲနှင့်စားပါ။ အပေါ်မှ နို့သောက်ပါ။

သမင်ဂျီ (ချို)

တိရစ္ဆာန်များ၏ဂျီ(ချို)များကို ပြာချ၍ ရောဂါအမျိုးမျိုး
တို့၌ အသုံးပြုရသည်။ အထူးအားဖြင့် နံဘေးအောင့်ခြင်း
နှင့် သန္ဓ်ပေါက်ရောဂါများ၌ ရသယနဆေးများ ဖြစ်ကုန်၏။

သမင်ဂျီပြာ(၁)

သမင်ဂျီ(ချို)ကို အမှုန့်ပြုပါ။ အပေါ်သို့ လက် ၂သစ်
အထိ တက်အောင် မရိုးစေးနှင့် စိမ်ထားပါ။ ခြောက်သော
အခါ ထပ်ပြီး မရိုးစေးနှင့်စိမ်၍ အခြောက်ခံပါ။ ထို့နောက်
မြေအိုး တလုံးတွင် ထည့်ကာ ဇော်သရွတ် မံပါ။ မီးသွေး
၅ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။ အလိုချမ်းသောအခါတွင် ယူပါ။ နောက်
ထပ် မရိုးစေးနှင့် တနေ့ကြိတ်နယ်ပြီး ဖုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း။
၄ ကြိမ်၊ ၅ ကြိမ် ဖုတ်ပါ။

အညွှန်း။ ။ အဆုတ်ရောဂါရှိသူကို သပုစ်သီးရွှာလပတ်ရည်
သို့မဟုတ် သလဲသီး ရွှာလပတ်ရည်နှင့် တိုက်ပါ။
နံဘေးအောင့်သူကို စမုန်စပါးပေါင်းတိုက်ရည်နှင့်
တိုက်ပါ။ အလွန်ကောင်း၏။

သမင်ချိုပြာ (၂)

သမင်ချိုပြာကို အမှုန့်ပြုပါ။ မြေအိုးတအိုးတွင် မရိုးစေးနှင့်
ကောင်းစွာ စိမ်ပါ။ ဇော်သရွတ် မံပါ။ တွင်းနက်စွာ တူး၍
လေမတိုက်သောနေရာတွင် မီးသွေး ၃၁ ပိဿာနှင့် ဖုတ်ပါ။
အေးသောအခါ ထုတ်ယူပါ။ အဖြူရလျှင်ကောင်း၏။ မဖြူလျှင်
ဤနည်းအတိုင်း ထပ်ဖုတ်ပါ။

အညွန့်။ ။တရွေးမှ ၂ရွေးခန့်အထိ ပျားရေနှင့် လျက်ပါ။
တနေ့ ၂ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ် လျက်နိုင်၏။ ဤသမင်ချို
၁၂ ပဲသားတွင် ရွှေဆိုင်၊ သင့်လျော်သလောက်
ထည့်ပါ။ပျားရေလက်ကော် ရ ထည့်၍စားခဲ့သော်
အသက်ရှည်ဆေးဖြစ်၏။

ကြက်ဥခွံပြာ

ကြက်ဥခွံတို့ကို ဆားရေတွင် ၄ ရက် စိမ်ပါ။ အတွင်းရှိ
အမွှေးများကိုခွါပစ်ပါ။ ၎င်းကို ၃ ရက်တိုင်မရိုးစေးတွင်စိမ်ပါ။
မြေအိုးတွင်ထည့်ပါ။ ဇော်သရွတ်မံပါ။ ထို့နောက် မီးသွေး
၆၂ ပိဿာနှင့်ဖုတ်ပါ။ ပြာဖြူကိုရမည်။

အညွန့်။ ။တရွေးခန့်မှ ၂ ရွေးအထိ ထောပတ်ခဲနှင့်စားပါ။
ဓာတ်ကုန်ခမ်းသောရောဂါ၊ အိပ်မက် သုက်လွတ်
ရောဂါအတွက် ကောင်း၏။

ကန့်ဆီ (၁)

ဆီးဖြူကန့် ၂ ကျပ် ၄ပဲသား၊ ဆေးဒန်း ၂ကျပ် ၄ ပဲ၊ ၂မျိုး
ကို ကောင်းစွာ အမှုန့်ပြုပါ။စဉ့်ခွက်တခုတွင်ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ
စဉ့်အဖုံးကိုဖုံးပါ။နေစဉ် မရိုးစေး ၂ကျပ် ၄ ပဲထည့်ပါ။ဤနည်း
အတိုင်း အရက် ၂၀ထည့်ပါ။လုံခြုံ ရာတွင်သိမ်းထားပါ။အရက်
၄၀ကြာသောအခါ ကြည့်ပါ။ အပေါက်ကလေးများ ဖြစ်နေ
သည်ကို တွေ့ရမည်။ ထိုအပေါက်များတွင် လှပသောအရောင်
ရှိသောဆီများ ပြည့်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုညစ်၍ဆီကိုယူပါ။

အညွန့်။ ။သီတဥတု၌ ကွမ်းရွက် တရွက်တွင်သုတ်၍စားပါ။

ထို့နောက် မလိုင် ၇ ကျပ် ၈ ပဲသားကို စားပါ။
ဤနည်းအတိုင်းကွမ်းရွက်တရွက်တိုး၍ ၇ ရွက်အထိ
စားပါ။ ၇ ရွက်ပြည့်လျှင် တရွက်စီလျော့၍စားပါ။
အလွန်ဆာလောင်လာ၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။

ကန့်ဆီ (၂)

ဆီးဖြူကန့် ၇ ကျပ် ၈ ပဲ၊ ဆား ၇ ကျပ် ၈ ပဲ။ ၂ မျိုးကို
၁၂ နာရီအထိ မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်နယ်ပါ။ အလုံးကလေးများ
လုပ်၍ နေရိပ်တွင်လှန်းပါ။ မြေအိုးတလုံးတွင်ထည့်၍ အပေါ်မှ
အိုးတလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တင်ပါ။ ဇော်သရွတ်မံပါ။ ခြောက်
သောအခါ ဖိုခနောက်ပေါ်တွင် တင်၍ တလက်မ ထူသော
ကနစိုသား ၂ ချောင်းနှင့်မီးထည့်ပါ။ အပေါ်က အိုးပေါ်တွင်
အဝတ် ၄ ထပ်ကိုရေစိမ်၍တင်ပါ။ အဝတ်ခြောက်လျှင် ထပ်ပြီး
ရေဆွတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၆ နာရီတိုင်တိုင်လုပ်ပါ။ အေး
သောအခါ ပြေးညှင်းသက်သာစွာခွဲပါ။ အပေါ် အိုးတွင်
ရွှေရောင်ဆီတို့ကို ရမည်။ ၎င်းဆီတို့ကို ဆုံတွင် ထည့်ကြိတ်ပါ။
၎င်းတွင် အလေးချိန် ၁၂ ပဲသားတိုင်းတွင် ဒုတ္တာ ၁ ပဲသား
ရောပါ။ ၆ နာရီတိုင်တိုင်မရိုးစေးနှင့်ကြိတ်နယ်ပါ။ ထို့နောက်
နှစ်တက်ချွန် အတောင့်ကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။ အခြောက်
လှန်းပါ။ မပါတာလယန္တရားဖြင့် ဆီချက်ပါ။ (အထူးသတိပြုရန်—
ပါတာလယန္တရားတစ်ဆိတ်ဆီ ၁ ပိဿာ ၂ ပိဿာထည့်၍
မီးတို့ပါ။ အလွန်နီမြန်းသောအထိကို ရမည်။

အညှန်း၊

ဤဆေးကိုလည်း အာထက်ပါ ကန့်ဆီ (၁) ကဲ့သို့
အသုံးပြုခဲ့သော် လျှောက်အလွန်ပွားစေ၏။