


ကယားပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရှင်းသားလူမျိုးတို့၏
ဆေးပြတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်)ချိုးခြင်း အလွှာအထား
သုတေသနပြု လွှဲလာခြင်း

သီဟမ်းသိန်း: B.M.T.M; NABP
ကုသရေးဌာနခွဲ၊ တိုင်းရှင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန



နိဒါန်း (Introduction)

ကယားပြည်နှယ်တွင် ကယား၊ ကယန်း၊ ကင်း၊
ဂေါ့၊ ဂေဘား၊ ယင်းဘော်၊ ယင်းတလဲ၊ မနုမန္တာ၊ ယော်မ်း၊
ကရင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုဝ်၊ ဗမာ၊ အင်းသား၊ လီဆူး၊ လီရှော သော
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မြိုတင်းနေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။
အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တို့သည် ရောဂါမဖြစ်ပွားမြန်း
ဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြန်လည်ကျန်းမာ လာစဉ်
နှင့် ကျန်းမာနေစဉ်တွင်လည်းကောင်း၊ မီးဖွားပြီးစတွင်
လည်းကောင်း၊

ကျွန်းမာစေရန်အတွက်
(ဆေးဝါးရည်) ပြုတ်ချိုးခြင်း အလေ့အထကို မြှုပ်နည်းလာ
ယုံကြည့်မှန်င့် ရုံးရာတိုင်းရင်းဆေးများ အပေါ်အားထားရှု
ယနေ့ထိထက်တိုင် ယုံကြည့်စွာ ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြ
သည်ကို တွေ့ရှုပါသည်။

အဆိုပါ ဆေးပြုတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်) ပြုတ်ချိုး ခြင်း
အလေ့အထကို တိုင်းရင်းဆေးပညာရှုထောင့်မှ
လည်းကောင်း၊ အစဉ်အလာ ကောင်းသော ရုံးရာအမွှု
အနှစ်ကို မပျောက်မပျောက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှုက်နိုင်စေရန်
သုတေသန ပြု၍ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးပြုတ်ရည်

ရည်ရွယ်ချက်များ (Objectives)

ယောကုယ့်ရည်ရွယ်ချက်(General Objective)

ကယားပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရှင်းသားလူများ တို့၏
ဆေးပြုတ်ရည် (ဆေးဝါးရည်) ချိုးခြင်း အလေ့အထက်
သိရှိနိုင်စေရန်။

အခိုက်ရည်ရွယ်ချက်များ(Specific Objectives)

- ကယားပြည်နယ်ရှိ
ဆေးပြတ်ရည် (ဆေးဝါးရည်) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏
မှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်။ ချိုးခြင်းအလေ့အထက်
- ဆေးပြတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်) ချိုးခြင်းအားဖြင့်
ပျောက်ကင်း နိုင်သော ရောဂါများကို သိရှိနိုင်စေရန်။
- ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသော လူနာများအတွက်
ဆေးပြတ်ရည် (ဆေးဝါးရည်) ချိုးခြင်းကို တွဲဖက်ကုတ်ထုံးအဖြစ်
အသုံးပြနိုင်စေရန်။

သုတေသနပြုလုပ်နည်း(Method)

- | | |
|--------------------|--|
| လွှဲလာသည့်အချိန် - | (၃)နှစ်ခန့်။ |
| လွှဲလာသည့်နေရာ - | ကယားပြည်နယ်။ |
| လွှဲလာမှုပုံစံ | - လက်တွေ့သုံးစွဲ
သူများကို တိုက်ရှိက
မေးဖြန်းဆွေးနွေး
ခြင်း။
ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့
သုံးစွဲကြည့်ခြင်း။ |

ဆေးပြုတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်)ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း (Definition)

ရောဂါဝေဒနာများကို ကျန်းမာစေရန်နှင့် ကြိုတင်
ကာကွယ်ရန်အတွက်သာမက ကုသရန်နှင့် သက်သာ
ပျောက်ကင်းစေရန်အတွက် ဆေးပက်ဝင် ဆေးဥ၊ ဆေးရွက်
ဆေးမြစ်တို့ကိုပြုတဲ့ ရေချိုးပေးခြင်းကို ဆေးပြုတ်ရည်
(ဆေးဝါးရည်) ချိုးခြင်းဟု ခေါ်ဆိုနိုင် ပါသည်။

ဆေးပြုတဲ့ရည်တွင် ပါဝင်သော ဆေးပစ္စည်းများနှင်း လိုအပ်သောပစ္စည်းများ

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
၁	တရော်ကင်းပွန်း	(၁) ထုပ်
၂	ဆူး(ဇူ)မျိုး	(၁) စည်း
၃	ဆေး(ဇူ)မျိုး	(၁) စည်း
၄	နှစ်င်းမှုန်း	(၁) ထုပ်
၅	ဒန်အိုး	(၁) လုံး
၆	ရေး	(၁) ပုံး
၇	မီးဖိုး	(၁) ဖိုး
၈	ချည်သားတဘက်	(၁) ထည်

ဆေး(၉)မျိုး

ဆေး(၉)မျိုးမှာ ဆေးပြုတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်)ချိုးရာတွင် အဓိက
ပါဝင်သော ဆေးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရွှေဂါများကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေသော
ဆေးပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ ၄၄းတို့မှာ -

စဉ်	အမည်	ရက္ခာဗျားအမည်	မျိုးရင်း
၁	ဆေးပူလဲ	<i>Geniara kuroo</i> , Royle	Gentianaceae
၂	ယင်းပြား	<i>Dichroa febrifugalour</i>	Saxifragaceae
၃	ဂျုံး	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberaceae
၄	ပိစပ်	<i>Eupatorium cannabinum</i> Linn.	Compositae
၅	ကြောင်ပန်း	<i>Vitex trifolia</i>	Verbenaceae
၆	နန္ဒံး	<i>Curcumalanga</i> Linn	Zingiberaceae
၇	သရင်းကြီး	<i>Croton oblongifolius</i> Roxb	Euphorbiaceae
၈	မိသာလိုင်	<i>Zingiber R.Br.Sp</i>	Zingiberaceae
၉	လင်းနေ	<i>Acorus calamus</i> Linn	Araceae

မှတ်ချက်။ ။ ဆေး(၉)မျိုးအသုံးပြုရာတွင် အကုန်လုံးမရနိုင်ပါက (၃)မျိုး၊ (၅)မျိုးမ (၇)မျိုးအထိ အသုံးပြု
တတ်ကြပါသည်။

ဆူး(၉)မျိုး

ဆူး(၉)မျိုးမှာ အညံ့အခိုက်ပြေစေရန်၊ အနှောက်အယှုက်ကင်း စေရန်၊ သူတစ်ပါး
ပြုစားခြင်းမှ လွှတ်ကင်းစေရန်၊ ဆေးပြုတ်ရည်အား အာနိသင်ပို့၍ ထက်မြက်စေရန်အတွက်
အသုံးပြုပါသည်။ ၄၈းဆူး(၉)မျိုးတို့မှာ -

စဉ်	အမည်	ရက္ခဖော်အမည်	မျိုးရင်း
၁	သံပရာ	<i>Citrus medica</i> Linn	Rutaceae
၂	ထိကရုံး	<i>Mimosa pudica</i> Linn	Mimosaceae
၃	ရှောက်	<i>Citrus limonum</i> Linn	Rutaceae
၄	ဆီး	<i>Ziziphus jujube</i> Mill and Lani	Rhamnaceae
၅	နန်းလုံးကြိုင်	<i>Acacia farnesiana(L)</i> Willd	Mimosaceae
၆	ကင်းပွန်းချဉ်	<i>Acacia canescens</i> , Grah	Mimosaceae
၇	နှင်းဆီ	<i>Rosa gallica</i> Linn.	Rosaceae
၈	ဆူးပန်း	<i>Mahonia thumbergii</i>	Berberidaceae
၉	တရာတ်မန်ကျည်း	<i>Pithecellobium dulce</i>	Mimosaceae

မှတ်ချက်။ ။ ဆူး(၉)မျိုးအသုံးပြုရာတွင် အကုန်လုံးမရနိုင်ပါက ၁၁ (၃)မျိုး၊ (၅)မျိုးမှ (၇)မျိုးအထိ
အသုံးပြုတတ်ကြပါသည်။

တရော်ကင်းပွန်း

တရော်ကင်ပွန်းကိုခေါင်းလျှော်ရန်အတွက်သာမက
လက်ဆေးခြင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ယတော်ခြေခြင်း အဖြစ်
လည်းကောင်း ထိုဒေသများတွင် အသုံးပြုပါသည်။

နန္ဒင်းမှန်(Curcuma Langa Linn)

နန္ဒင်းမှန်မှာ ဆေးပြုတံကည် ချိုးပြီးနောက်တွင်
သွေးလေညီညွတ်စေပြီး ရောဂါများ သက်သာ
ပျောက်ကင်းစေရန်အတွက် ရေနွေးပူပူဖြင့် သောက်သုံး ရန်
ဖြစ်ပါသည်။

ပိုးဖွားပြီးစနှင့် သားပျက်သားလျှော်ပြီးသော လူနာများ
အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။

ဆေးပြတ်ရည်ချိုးရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	မှတ်ချက်
၁	ဆေးပြတ်ရည်ထုပ်	(၁) ထုပ်	၃၀၀ ကျပ်	-
၂	ဆူး(ဇူ)မျိုး	(၁) စည်း	၂၀၀ ကျပ်	-
၃	တရော်ကင်ပွန်း	(၁) ထုပ်	၁၀၀ ကျပ်	-
၄	နှစ်င်းမှုနှံ	(၁) ထုပ်	၁၀၀ ကျပ်	-
စုစုပေါင်း		(၄) မျိုး	၇၀၀ ကျပ်	-

ဆေးပြတ်ရည်ချိုးရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၇၀၀)ကျပ်ခန့်သာဖြစ်၍။

လူတန်းစားအားလုံး လက်လှမ်းမိန့်င်သော ငွေကြေးဖြစ်ပြီး

ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း အလွန်ချိုးသာပါသည်။

ဆေးပြတ်ရည်နှင့်ချိုးသင့်ဘာ လူနာများ

၁။	ဆေးပြုတ်ရည်နှင့်ချိုးသင့်သောလူနာများမှာ - ဖွေး၊ ဝဲ၊ နှင့်ဗျာ၊ ရွှေတ်၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ အရေပြားမှိုစွဲခြင်း၊ အဖွေးထသည့် အရေပြားရောဂါများ၊	အဖုအပိုနှင့်
၂။	အဆစ်ရောင်ကိုက်ရောဂါများ	
၃။	ထံနာကျင်နာရောဂါများ	
၄။	လေဖြတ်၊ လေငန်းနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ	
၅။	ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတောင့်တင်းရောဂါများ	
၆။	မီးဖွားပြီးစလူနာများ	
၇။	သားပျက်သားလျောလူနာများ	
၈။	ထိန်းချုပ်ကုသထားသော သွေးတိုးလူနာများ	သွေးချို့၊ ဆီးချို့
၉။	ပြန်လည်ကျန်းမာခါစလူနာများနှင့် ကျန်းမာ ပါသည်။	ရောဂါများကာကွယ်ရန် ဆေးပြုတ်ရည်ဖြင့်
	နေသောလူများပါ	အတွက် ရေချိုးနိုင်

အေးပြတ်ရည်နှင့်မချိုးသင့်သော လူနာများ

အေးပြတ်ရည်နှင့်မချိုးသင့်သောလူနာများမှာ -

- ၁။ အားအလွန်နည်းနေသော ရောဂါဝေဒနာရှင်များ
- ၂။ အိပ်ယာထက်တာရည်စွာ လွှဲနေရသောလူနာများနှင့် အိပ်ရာနာရှိနေသော လူနာများ
- ၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ
- ၄။ သွေးချိုး၊ ဆီးချိုးရောဂါပြင်းထန်နေသောလူနာများ
- ၅။ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားနေသောလူနာများ
- ၆။ နှုနာရောဂါဝေဒနာရှင်များ
- ၇။ အေးပြတ်ရည်ချိုးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိသော ကလေးများနှင့် အသက်ကြိုး
သောလူနာများ
- အသည့်ရောဂါဝေဒနာရှင်များ
ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။
- အေးပြတ်ရည်ဖြင့်ချိုးခြင်းကို

ဆေးပြုတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်)ပြုတ်ခြင်း

မီးဖိုအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် အန်အိုးထဲသို့ ရေပုံး(၁)ပုံး၊
ဆူး(၉)ပုံး၊ ဆေး(၉)ပုံးတို့ကို ထည့်ရပါမည်။ ထိုနောက်
ရေကုံဆူဗုပ်က်လာအောင်တည့်ရပါမည်။

ဆေးပြုတ်ရည်ဆူလာပြီး ပြုတ်ထားသော ဆေးရည်သည်
တစ်ဖြည်းဖြည်း အဝါရောင်ဘက်သို့ သန်းလာပြီး အနည်းငယ်
မွန်၍ မွေးကြိုင်သော ဆေးပြုတ်ရည်ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးပြုတ်ရည်မချိုးမှု လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးရန်အတွက် အနည်းဆုံးအစာစားပြီး (၂)နာရီခန့်နှင့် အစာကြေပြီးချိန်ဖြစ်ရပါမည်။
- နေ့ပူးချိန်အတွက် အနည်းဆုံးအစာစားပြီးချိန်ဖြစ်ရပါမည်။
- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးရန်နေရာမှာ လေလုံသောနေရာဖြစ်ရပါမည်။
- ဆေးပြုတ်ရည်နှင့် ချိုးမည့်သူသည် အသိ၊ သတိကောင်းစွာရှိပြီး ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။
- ဆေးပြုတ်ရည် မချိုးမှု (၁၅)မိနစ်ခန့်ကြိုးရှိနိုင် ရေစွဲးပူးပူးသောက်ရပါမည်။

ဆေးပြုတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်)စနစ်တကျ ချိုးနည်းအဆင့်ဆင့်

- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးမည့်သူသည်
ခေါင်းလျှော်နိုင်လျှင် ပို၍ကောင်း ပါသည်။တရော်ကင်းပွန်းဖြင့်
- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးရာတွင်
အထူးရှောင်ကြည်ရပါမည်။
ဆပ်ပြာတိုက်၍
ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးခြင်းမှာ
ဆေးပြုတ်ရည်ပူးပူကိုချိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ချိုးခြင်းကို
- တဘက်ကို ဆေးပြုတ်ရည်ပူးပူထဲသို့နှစ်ပါ။ ထိုနောက် ဆယ်ယူပြီး
ပူးနွေးသောတဘက်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အနုံသို့ ပွတ်တိုက်ပေးရပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အနည်းဆုံး(၃)ကြိမ်မှ(၅)ကြိမ်
ပွတ်တိုက်ပေးရပါသည်။ခန့်အထိ

ဆေးပြုတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်)စနစ်တကျ ချိုးနည်းအဆင့်ဆင့်

- ထိုနောက် တဘက်စကို ကြပ်ထုပ်ပုံစံပြုလုပ်၍ ဆေးပြုတ်ရည်တွင် နှစ်ကာဆယ်ယူပြီး တစ်ကိုယ်လုံး အနဲ့ ကြပ်ထုပ်ထိုးသကဲ့သို့ အနည်းဆုံး(၃)မိနစ်မှ ၅)မိနစ်ခန့်အထိ ထုရိုက်ပေးရပါသည်။
ထိုနောက် ပြုတ်ထားသော အိုးထဲမှ ဆေးပြုတ်ရည်ပူးပူးများကို ခန္ဓာကိုယ်အနဲ့လောင်း၍ ချိုးပေးရပါမည်။ ဆေးပြုတ် ရည်ကုန်လျှင် ရပ်ရပါမည်။
- (*ရေအေးဖြင့်ထပ်၍ချိုးခြင်းကို အထူးရှောင်ကျဉ်ရပါမည်။)
- ထိုနောက် ရေခြောက်အောင်သုတ်ပေးရပါမည်။ ပြီးလျှင်ပွဲ၍ ရောင်ချိသော အဝတ်အစား များဝတ်ဆင်ရပါမည်။


ဆေးပြုတ်ရည် ချိုးပြီးလိုက်နာရန်

- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးပြီးနောက် လူနာသည် လေတိက်ခံ၍ မခံရပါ။
- လူနာကို အလင်းရောင်ရှု လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော နေရာ တွင်ထားရပါမည်။
- လူနာသည် နှစ်င်းမှုန့်ကို လက်ဖက်စားစွန်း (၂)စွန်းခန့်ကို ရေနေးပူးပူးဖြင့် သောက်ရပါမည်။
- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးပြီး နာရီဝက်အတွင်း အစာမစားရပါ။
- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးပြီး အနည်းဆုံးတစ်နာရီကျော်မှ အပြင်ထွက်သင့် ပါသည်။
- ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးပြီးလူနာသည် နားနေသင့်ပါသည်။ ပြင်းထန် သော ကိုယ်လက်လှပ်ရှားမှုများ မပြုလှပ်ရပါ။

ဆေးပြုတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်) ချိုးခြင်းအပေါ်
တိုင်းရင်းဆေးပညာရှုထောင့်မှုအမြင်

ဆေးပြုတ်ရည်တွင် အသုံးပြုထားသော ဆေးပစ္စည်း များသည်
(တေဇား၊ ဝါယာ၊ အကာသ)တော် လွန်ကဲသော
ဆေးပစ္စည်းများဖြစ်ခြင်း၊ လူနာ၌ပတ်ဖွဲ့နေသော (အာဟနနှင့်)
ရောဂါများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသော စနစ်ကျသော
ကုထုံးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၊ (တေဇား၊ ဝါယာ၊ အကာသ)
တော်တို့ကို မှန်ကန်စေရုံသာမက (ပထဝီ၊ အာပေါ်)တော် တို့ကိုပါ
ညီညွတ်မျှတစေသည့်အတွက် လူနာများအတွက် အကျိုးရှိသော
ကုထုံးကောင်းတစ်ရပ်အဖြင့် ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။





ကယားပြည်နယ်ရှိ ဆေးပြတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်)အရောင်းဆိုင်



၁၅
ရွှေးကွက်တွင် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သော ဆေးပြုတဲ့ရည်(ဆေးဝါးရည်)
အထုပ်များ



ဆေးပြတ်ရည်(ဆေးဝါးရည်) အထုပ်များတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းတစ်ခို့။



27

အမြောလွှာကယ်သွေ့ချုပ်ရွာလှ
တစ်ဦး - ၁၉၆၂၁၂ (၁၃၇၈၁၂ - ၀၅၁၈၁၄)

ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကောက်ချက်ဆွဲ အကြံပြခြင်း (Conclusion and Suggestion)

ဆေးပြတ်ရည်ချိုးခြင်းစလေ့သည်
တိုင်းရင်းသားများ
ကုထုံးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး
ရည်အထုပ်များကို
သုံးစွဲရသည်မှာလည်း
များပါဝင်ခြင်း၊
ဆောင်ရွက်ရန်များပါရှိခြင်း၊
မချိုးသင့်သောလူနာများကို
အမှန်တစ်ကယ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို ကယားပြည်နယ်ရှိ
ယုံကြည်စွာဖြင့်
ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာခြင်း၊ ဆေးပြတ်
လွယ်ကူစွာဖြင့်
ခက်ခဲမှုမရှိခြင်း၊ ရိုးရာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု
ဆေးပြတ်ရည်မချိုးမီနှင့်ချိုးပြီး
ဆေးပြတ်ရည် ချိုးသင့်သောလူနာ၊
ခွဲ့စားပြသနိုင်ခြင်း၊ လူနာများ ပေါ်တွင်
အမှန်တစ်ကယ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကောက်ချက်ဆွဲ အကြံပြုခြင်း (Conclusion and Suggestion)

ဆေးပြုတ်ရည်ချိုးခြင်းအလေ့အထအား

တိုင်းရင်းဆေးပညာကုတုံးတစ်ရပ်	အဖြစ်	လက်ခံ
အသုံးပြနိုင်ပြီး	ဤကုတုံးဖြင့်	တိုင်းရင်းဆေးပညာ
လောကဖွံ့ဖြိုး	တိုးတက်နိုင်ရေးအတွက်	တစ်ထောင့်
တစ်နေရာမှ	ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဟု	ယုံကြည်လျက်
မပျောက်မပျက်စေရန်	ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်ပါ	ကြောင်း
တင်ပြအပ်ပါသည်။		

ကျမ်းကိုးစာရင်း(References)

- ၁။ မြန်မာ့အကြောပြုအတတ်ပညာကျမ်း
အရှင်နာဂသီမံမဟာထော်(သိမ်ဖြူ)
- ၂။ လက်တွေ့အသုံးချုပ်မာကုတုံးဆေးပညာကျမ်း
ဆရာတိုးဦးဟန်ထွန်း(ပိုးနံ)
- ၃။ ပွဲကမ္မကုတုံး၊ တတိယနှစ် (B.M.T.M)
- ၄။ မှတ်စုံများ
- ၅။ ဒေသခံများအားမေးမြန်းဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးဇူးတင်လွှာ

ဤစာတမ်းကို

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီး

ဒေါက်တာဦးထွန်းနိုင်ဦးနှင့်

ဘဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း

ဤစာတမ်းဖြစ်မြောက်ရန်အတွက်

တိုင်းရင်းဆေးရုံမှု

တို့အားလည်းကောင်း၊

ယခုကဲသို့အရှယ်

အနိုင်ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါး

မေမေဒေါ်အုန်းသိန်းတို့အားလည်းကောင်း၊

တင်သွင်းဖတ်ကြားခွင့်ပြပါသော

ဌာန၊ ဆွန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီး၊ ဌာနမှ

ကူညီပေးပါသော လိုင်ကော်

ဆရာဦးမျိုးမြင့်နှင့် ဆရာဦးမင်းသူ

ယောက်တော်ကျေးကလေးဘဝမှစ၍

ဆုံးမပဲ့ပြင်သွန်သင်ပေးခဲ့သော

ဖြစ်ကြသော ဖေဖော်းမင်းလွင်၊

ကျေးဇူးတင်လွှာ

ဤစာတမ်းအတွက် တွန်းအားများဖြစ်သောကျွန်တော်၏
ဇနီးမခင်ထွေးမှုနှင့် သမီးမသန္တာမင်းသိန်းတို့ အား လည်းကောင်း၊
သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြေားဆရာ အပေါင်းများအားလည်းကောင်း၊
အမိတိုင်းရင်းဆေး တက္ကသိုလ်ကြီး နှင့်တက္က ဤစာတမ်းအား
စလည်ဆုံး ဖြစ်မြောက်အောင် ကူညီပေးပါသော ကိုချစ်ကိုး
(ကျွန်းမာရေး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန)နှင့် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများ
အားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု
အပ်ပါသည်။



ယောက်ချောင်းမြန်မာ ကပ္ပလာ ကပ္ပလာ
တတိပု - ဗောက်သန်(ဗွဲ့လန်း - ပင်လောင်)



ကျေးဇူးတင်ပါသည်...